

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

Nom du médicament, forme pharmaceutique	Titulaire de l'AMM	Type de procédure/ date d'AMM	Substances actives	Espèces cibles	Posologie et voie d'administration
CANIGEN CHPPi/LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 05/11/1990	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Après reconstitution du lyophilisat à l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN CHPPi/L suivie d'une injection de CANIGEN CHPPi/LR 3 à 4 semaines après. L'injection de CANIGEN CHPPi/LR ne doit pas se faire avant 3 mois d'âge. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CHPPi/LR.
CANIGEN LR, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 03/01/1983	leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chien	Administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN L suivie d'une injection de CANIGEN LR 3 à 4 semaines plus tard. L'injection de CANIGEN LR ne doit pas se faire avant l'âge de 3 mois. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN LR.
ENDURACELL R MONO, Suspension injectable	ZOETIS FRANCE	Nationale 22/06/1988	virus rabique	Bovins, Caprins, Chat, Chien, Equins, Ovins	Bien agiter le flacon avant utilisation. L'injection doit être réalisée sur une zone de peau propre et sèche, en prenant les précautions aseptiques contre la contamination. Administrer une dose de 1 ml par voie sous-cutanée quels que soient l'âge et l'espèce selon le schéma suivant : - Primovaccination : 1 dose à partir de l'âge de 3 mois. - Rappel : annuel.
EURICAN DAP-LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Nationale 16/07/1987	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus rabique	Chien	Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou de désinfectant. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection : à partir du 3ème mois d'âge. Une injection : un mois avant ou après avec un vaccin BOEHRINGER INGELHEIM contre les leptospiroses. Rappels : annuels. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.

En date du 4 mars 2020



EURICAN DAPPI-LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Reconnaissance mutuelle, FR=EMR 13/05/2005	adenovirus canin, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chien	Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination : une injection avec EURICAN CHPPi2-LR à partir de la 12ème semaine d'âge, 3 à 5 semaines avant ou après l'injection du vaccin EURICAN CHPPi2-L.- Rappels : Annuels.
EURICAN LR, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Nationale 16/07/1987	leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chien	Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou désinfectant. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection : à partir du 3ème mois d'âge. Une injection : 1 mois avant ou après avec un vaccin BOEHRINGER INGELHEIM contre les leptospiroses. Rappels : Annuels. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.
FELIGEN CRP/R, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 15/02/1988	calicivirus félin, herpesvirus félin, parvovirus félin, virus rabique	Chat	Reconstituer le vaccin en mélangeant le lyophilisat et la suspension. Agiter doucement et administrer immédiatement. Administrer une dose de vaccin par voie sous-cutanée selon le schéma vaccinal ci-dessous : Primo-vaccination : Une première injection de FELIGEN CRP à partir de l'âge de 8/9 semaines Une deuxième injection de FELIGEN CRP/R 3 à 4 semaines plus tard. Rappels :Annuels avec une dose unique.
NOBIVAC RAGE, Suspension injectable	INTERVET	Nationale 03/04/1985	virus rabique	Bovins, Chat, Chien, Equins	1 dose de 1 mL, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. <u>Chiens et chats</u> - Primo-vaccination à partir de 12 semaines d'âge, une injection de 1 mL. - Rappel annuel : une injection de 1 mL. <u>Bovins et équins</u> Primo-vaccination à partir du 6ème mois, une injection de 1 mL. Rappel annuel : une injection de 1 mL.
PUREVAX RABIES, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Centralisée 18/02/2011	virus rabique	Chat	Voie sous-cutanée. Administrer une dose de 1 ml, selon le schéma de vaccination suivant: Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines. Rappel : 1 an après la primovaccination, puis à 3 ans maximum d'intervalle. Voyages dans des pays exigeant un test sérologique de la rage : l'expérience a montré que certains animaux vaccinés, bien que protégés, ne présentent pas le taux d'anticorps de 0.5 UI/ml requis par certains pays. Les vétérinaires praticiens peuvent alors envisager deux vaccinations. Le meilleur moment pour effectuer la prise de sang est environ 28 jours après la vaccination.



RABIGEN MONO, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 26/01/1987	virus rabique	Chat, Chien, Equins	Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : <i>Primo-vaccination</i> <u>Chiens et chats</u> : 1 dose à partir de 3 mois d'âge <u>Equins</u> : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. <i>Vaccination de rappel</i> <u>Chiens, chats, équins</u> : une injection annuelle
RABIGEN MULTI, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 20/05/2010	virus rabique	Chat, Chien, Equins	Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : <i>Primo-vaccination</i> <u>Chiens et chats</u> : 1 dose à partir de 3 mois d'âge <u>Equins</u> : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. <i>Vaccination de rappel</i> <u>Chiens, chats, équins</u> : une injection annuelle
RABISIN, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Nationale 07/01/1981	virus rabique	Bovins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins	Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant : <u>Chiens, chats</u> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines* <i>Rappels</i> : 1 an après la primo vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum** <u>Furets</u> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois <i>Rappels</i> : Annuels <u>Chevaux</u> <i>De — de 6 mois</i> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard <i>Rappels</i> : Annuels <i>De + de 6 mois</i> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection <i>Rappels</i> : Annuels <u>Bovins, ovins</u> <i>De - de 9 mois</i> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge <i>Rappels</i> : Annuels <i>De + de 9 mois</i> <i>Primo-vaccination</i> : 1 injection <i>Rappels</i> : Annuels *Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard.

					<p>** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays.</p> <p>*** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.</p>
RABISIN MULTI, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM	Nationale 06/04/2010	virus rabique	Bovins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins	<p>Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant :</p> <p><u>Chiens, chats</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines* Rappels : 1 an après la primo-vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum**</p> <p><u>Furets</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois Rappels : Annuels</p> <p><u>Chevaux</u> <i>De - de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard Rappels : Annuels <i>De + de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels</p> <p><u>Bovins, ovins</u> <i>De - de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge Rappels : Annuels <i>De + de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection* Rappels : Annuels</p> <p>Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard.</p> <p>** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays.</p> <p>*** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.</p>
VERSICAN PLUS DHPPI/L4R LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Poudre et solvant pour suspension injectable	ZOETIS BELGIUM	Centralisée 07/05/2014	adenovirus canin, leptospira interrogans sg australis, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae,	Chien	<p>Voie sous-cutanée.</p> <p>Dose et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Le vaccin reconstitué : couleur rose / rouge, ou jaune avec une légère opalescence.</p>

En date du 4 mars 2020

			<p>parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>		<p>Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus DHPPi/L4R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge.</p> <p>Rage : L'efficacité de la fraction de la rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. Par conséquent, la première dose peut être administrée avec Versican Plus DHPPi/L4. Dans ce cas, la deuxième vaccination avec Versican Plus DHPPi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain, 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montré de séroconversion (> 0,1 UI / ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage. De plus, 17 % des chiens n'atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage demandé par certains pays non membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones à risque ou en cas de voyage en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliser une primo-vaccination en deux doses, y compris contre la rage ou effectuer une vaccination supplémentaire contre la rage après 12 semaines. En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité du produit a été démontrée chez les chiens âgés de 6 semaines.</p> <p>Re-vaccination : Une dose unique de Versican Plus DHPPi/L4R à administrer annuellement.</p>
<p>VERSICAN PLUS Pi/L4R LYOPHILISAT ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable</p>	ZOETIS BELGIUM	Centralisée 31/07/2014	<p>leptospira interrogans sg bratislava, leptospira interrogans sg canicola, leptospira interrogans sg grippotyphosa, leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	Chien	<p>Voie sous-cutanée.</p> <p>Dose et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Vaccin reconstitué : couleur rose/rouge ou jaunâtre, avec une légère opalescence.</p> <p>Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus Pi/L4 R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge.</p> <p>Rage : L'efficacité de la fraction rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. La première dose peut donc être administrée avec Versican Plus Pi/L4. Dans ce cas, la seconde vaccination avec Versican Plus Pi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montrés de séroconversion (> 0,1 UI/ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage . De plus, 17 % des chiens n'atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage demandé par certains pays non membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones à risque ou en cas de voyage en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliser une primo-vaccination en deux doses, y compris contre la rage ou effectuer une vaccination supplémentaire contre la rage après 12 semaines. En cas de besoin, les</p>



					chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité de Versican Plus Pi/L4R a été démontrée chez les chiens de 6 semaines. Rappel : Une dose unique de Versican Plus Pi/L4 R à administrer annuellement.
VERSIGUARD RABIES, Solution injectable	ZOETIS FRANCE	Reconnaissance mutuelle, FR=EMC 09/05/2006	virus rabique	Bovins, Caprins, Chat, Chien, Equins, Furet, Ovins, Porc charcutier, Porc reproducteur	Posologie et voie d'administration: Agiter le flacon avant l'utilisation. L'administration d'une dose unique de 1 ml est suffisante quel que soit l'âge, le poids, ou la race de l'animal. Administrer par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Primo-vaccination: Les animaux de toutes les espèces cibles peuvent être vaccinés à partir de 12 semaines d'âge. La primo-vaccination est faite avec une dose unique de 1 ml de vaccin. Rappel: Les animaux doivent être revaccinés avec une dose de 1 ml de vaccin 1 an après la première vaccination. Après le premier rappel (administré 1 an après la primo-vaccination), les animaux doivent être revaccinés tous les 2 ans avec une dose de 1 ml de vaccin. Administration concomitante avec des vaccins canins de la gamme VANGUARD : Les vaccins VANGUARD doivent être reconstitués conformément aux données des Résumés des Caractéristiques des produits. Le flacon reconstitué doit être bien agité puis mélangé avec 1 ml de VANGUARD R, soit dans le flacon de VANGUARD R, soit dans la seringue. Bien agiter VANGUARD R avant emploi. Les vaccins mélangés doivent être agités doucement puis administrés immédiatement par voie sous-cutanée.