

## MERILYM 3 SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS – vaccin – maladie de Lyme – Rupture d’approvisionnement

Date d’actualisation : 25/05/2020

<b>Nom du médicament vétérinaire</b>	MERILYM 3 SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS
<b>Laboratoire exploitant</b>	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON
<b>Date de la rupture</b>	Janvier 2020
<b>Principe actif</b>	<i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> inactivées ( <i>B. garinii</i> , <i>B. afzelli</i> , <i>B. burgdorferi sensu stricto</i> )
<b>Indications</b>	Chez le chien : Immunisation active à partir de 12 semaines d’âge pour induire une réponse anti-OspA contre <i>Borrelia</i> spp ( <i>B. burgdorferi sensu stricto</i> , <i>B. garinii</i> et <i>B. azelii</i> )
<b>Motif de la rupture</b>	Rupture intermittente en cascade suite à la rupture puis à l’arrêt de Merilym
<b>Date prévisionnelle de remise à disposition</b>	Remise à disposition partielle en mars 2020 puis plus substantielle le 30 avril 2020, donnant un stock disponible à la vente pour le mois de mai 2020.  Des ruptures intermittentes sont encore possibles dans les mois à venir, avec des mesures éventuelles de contingentement/allocation par Boehringer Ingelheim Animal Health France, en attendant une montée en production suffisante pour répondre à la demande consécutive à l’arrêt définitif de commercialisation de Merilym.
<b>Observations particulières</b>	Solution palliative et/ou conseil à l’attention des praticiens : <ul style="list-style-type: none"><li>• Renforcer l’observance de la protection contre les tiques, vecteurs de la maladie de Lyme</li><li>• Renforcer la surveillance des chiens piqués par des tiques dans les zones à risque</li><li>• Utilisation de Merilym 3 suspension injectable pour chiens, en priorité dans les situations épidémiologiques les plus à risque.</li><li>• Utilisation de Merilym impossible car en arrêt de commercialisation (décision de mai 2020).</li></ul>