

ANNEXE

INFORMATIONS DISPONIBLES

Dénomination du médicament vétérinaire

VACCIN CONTRE ADENOVIRUS AVIAIRE DE DIFFERENTS SEROTYPES

Composition qualitative et quantitative

Une dose de 0,5 mL :

Agent pathogène :

Adénovirus aviaires..... 10^{6.0} DICT₅₀

Adjuvant :

Paraffine liquide..... 286 mg

Forme pharmaceutique

Emulsion injectable.

Informations cliniques

Espèces cibles

Poule.

Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Immunisation active des poules contre les infections à adénovirus aviaires.

Contre-indications

Aucune connue.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Précautions particulières à prendre par la personne oui administre le produit aux animaux

Faire réchauffer le vaccin à température ambiante (de 18°C à 20°C) et bien agiter avant emploi. N'utiliser que des instruments de vaccination stériles. Eviter toute contamination.

Autres précautions

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Aucun connu.

Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Ne pas mélanger avec d'autres vaccins, produits immunologiques ou médicaments vétérinaires.

Posologie et voie d'administration

Injection intramusculaire profonde de 0,5 mL dans la région des muscles pectoraux, ou injection sous-cutanée.

Il faut, afin de s'assurer de la bonne tolérance du vaccin par l'élevage, commencer par vacciner 10 des animaux cibles les plus jeunes en injectant en intramusculaire profonde dans la région des muscles pectoraux, ou en sous-cutanée, une dose de 0,5 mL par animal, puis les observer pendant 3 jours. Le reste du cheptel ne devra alors être traité que si aucune réaction locale ou générale au vaccin ne s'est manifestée.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Temps d'attente

Zéro jour.

Propriétés immunologiques

Liste des excipients

Incompatibilités majeures

Durée de conservation

Précautions particulières de conservation

Ne vacciner que des animaux sains.

Consulter immédiatement un médecin en cas d'auto-injection accidentelle et lui présenter le mode d'emploi ou l'étiquette du vaccin.

Conserver les produits pharmaceutiques hors de vue et de portée des enfants.

Stocker au réfrigérateur (entre +2 °C et +8 °C).

Ne pas congeler.

Utiliser dans les 24 heures après ouverture.

Ne plus utiliser le vaccin après la date de péremption indiquée sur le flacon.

Nature et composition du conditionnement primaire

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Nom et adresse de l'importateur / Titulaire de l'ATU

VAXXINOVA
ANTON-FLETTNER-STRASSE 6
27472 CUXHAVEN
ALLEMAGNE

Présentation(s) disponible(s)

Flacon de 500 mL (1000 doses)

Numéro de lot

Date de péremption

Mentions réglementaires

USAGE VETERINAIRE.
AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION N° 90029