



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité



## Décision relative à une modification administrative d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide

N° AMM : FR-2022-0080

*Vu les dispositions du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et de ses textes d'application,*

*Vu le code de l'environnement et notamment le chapitre II du titre II du livre V des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande de modification administrative portant sur l'ajout d'un nouveau fabricant en substance active et la suppression du fabricant en substance active ADAMA Agriculture España S.A. pour le produit biocide NOVAR EC GEL ROACHES*

de la société

Laboratorios Econovar S.L.

enregistrée sous le numéro

BC-QQ099824-99

### Article 1<sup>er</sup>

La modification administrative de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide désigné ci-dessus est accordée en France dans les conditions précisées en annexe de la présente décision.

### Article 2

La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions générales applicables aux produits biocides, notamment en matière d'étiquetage.

L'échéance de validité de l'autorisation du présent produit est fixée au 31 décembre 2025.

En cas de dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 31 du règlement (UE) n°528/2012 au minimum 550 jours avant la date d'expiration de la présente autorisation et en l'absence de décision statuant sur son renouvellement avant la date d'expiration, l'autorisation de mise à disposition sur le marché est prolongée de plein droit pour la durée nécessaire à l'achèvement de son évaluation.

A Maisons-Alfort, le 09/09/2025

Pour le directeur général et par délégation  
Le directeur des autorisations  
de mise sur le marché

DocuSigned by:

Bertrand BITAUD

33BC435FF8C6444...



## ANNEXE : Résumé des caractéristiques du produit

*Les modifications apportées par la présente décision sont indiquées en italique.*

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom commercial du produit

Nom commercial	NOVAR EC GEL ROACHES
Autre(s) nom(s) commercial(aux)	ECOGEL ANTICAFARDS EC GEL BLATTES EC GEL ANTI CAFARDS EC GEL CAFARDS THE ORIGINAL

#### 1.2. Détenteur de l'autorisation de mise sur le marché

Nom et adresse du détenteur	<b>Nom</b>	LABORATORIOS ECONOVAR S.L.
	<b>Adresse</b>	VIA AUGUSTA, 48 08006 BARCELONA CATALONIA ESPAGNE
Numéro de demande	BC-QQ099824-99	
Type de demande	Changement administratif d'une autorisation nationale (NA-ADC)	
Numéro d'autorisation	FR-2022-0080	
Date d'autorisation	25/10/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	31/12/2025	

#### 1.3. Fabricant(s) du produit biocide

Nom du fabricant	MYLVA S.A.
Adresse du fabricant	VIA AUGUSTA, 48 08006 BARCELONE ESPAGNE
Emplacement des sites de fabrication	SAINT GALDERIC, 23, POLIGON INDUSTRIAL PONENT, SANT POL DE MAR, 08395 BARCELONE ESPAGNE

#### 1.4. Fabricant(s) de la (des) substance(s) active(s)

Substance active	Imidaclopride
Nom du fabricant	MYLVA S.A.
Adresse du fabricant	VIA AUGUSTA 48, 6-2, 08006 BARCELONA ESPAGNE
Emplacement des sites de fabrication	SHANDONG SINO-AGRI UNITED BIOTECHNOLOGY CO., LTD., FANZHEN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, DAIYUE DISTRICT 27100 TAI'AN CITY, SHANDONG PROVINCE CHINE



## 2. Composition du produit et type de formulation

### 2.1. Composition qualitative et quantitative du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro EC	Contenu (%)
Imidaclopride	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine	Substance active	138261-41-3	428-040-8	2,15

### 2.2. Type de formulation

RB – Appât (prêt à l'emploi)

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

### 3.1. Classification et étiquetage du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008

<b>Classification</b>	
Catégories de danger	Toxicité aquatique aigüe catégorie 1 Toxicité aquatique chronique catégorie 1
Mentions de danger	H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
<b>Etiquetage</b>	
Mentions d'avertissement	Attention
Mentions de danger	H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
Conseils de prudence	P102 : Tenir hors de la portée des enfants P103 : Lire l'étiquette avant utilisation P273 : Eviter le rejet dans l'environnement P391 : Recueillir le produit répandu P501 : Eliminer le contenu / récipient dans ...
Note	EUH208 Contient de la 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one et 2-octyl-1,2-thiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

## 4. Usage(s) autorisé(s)

### 4.1. Description de l'usage

Tableau 1. Usage # 1 – Application de gouttes de gel via l'utilisation de seringue par les non-professionnels

Type de produit	TP18
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)</li> <li>- Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)</li> <li>- Blatte américaine (<i>Periplaneta Americana</i>)</li> </ul> <p>Stades nymphes et adultes</p>



<b>Domaine(s) d'utilisation</b>	Application ciblée en intérieur dans les fissures et crevasses
<b>Méthode(s) d'application</b>	Application de manière ciblée d'appât par gouttes de gel dans des crevasses et fissures à l'aide d'une seringue
<b>Dose(s) et fréquence(s) d'application</b>	<p>Appliquer en gouttes de 0,04 g</p> <p><u>Blatte germanique :</u>            - faible infestation : 0,12 g/m<sup>2</sup> (3 gouttes)            - forte infestation : 0,16 g/m<sup>2</sup> (4 gouttes)</p> <p><u>Blatte orientale et blatte américaine :</u>            - faible infestation : 0,16 g/m<sup>2</sup> (4 gouttes)            - forte infestation : 0,24 g/m<sup>2</sup> (6 gouttes)</p> <p><u>Fréquence d'application lors d'un traitement :</u> 1 application sur 4 semaines.            Ne réappliquer le produit qu'une seule fois si l'infestation persiste. Ne pas appliquer plus de 12 gouttes par maison.</p>
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Non professionnels
<b>Taille(s) et type(s) de conditionnement</b>	Seringues en LDPE de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 g

#### 4.1.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage

- Appliquer le produit biocide de manière ciblée uniquement dans les fissures et crevasses derrière les meubles ou appareils ménagers. Le produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces accessibles.
- Ne pas appliquer sur le bois ou les surfaces poreuses.

#### 4.1.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Le produit ne doit pas être appliqué dans des zones accessibles aux enfants.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux ou avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- Appliquer dans des zones difficilement accessibles, non susceptibles d'être lavées et totalement à l'abri de l'eau.

#### 4.1.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### 4.1.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales

Se référer aux conditions générales d'utilisation



#### 4.2. Description de l'usage

Tableau 2. Usage # 2 – Application de gouttes de gel via l'utilisation de seringue ou de cartouche

Type de produit	TP18
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)</li> <li>- Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)</li> <li>- Blatte américaine (<i>Periplaneta Americana</i>)</li> </ul> Stades nymphe et adulte
Domaine(s) d'utilisation	Application ciblée en intérieur dans les fissures et crevasses
Méthode(s) d'application	Application de manière ciblée d'appât par gouttes de gel dans des crevasses et fissures à l'aide d'une seringue ou d'une cartouche
Dose(s) et fréquence(s) d'application	Appliquer en gouttes de 0,04 g  <u>Blatte germanique :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- faible infestation : 0,12 g/m<sup>2</sup> (3 gouttes)</li> <li>- forte infestation : 0,16 g/m<sup>2</sup> (4 gouttes)</li> </ul> <u>Blatte orientale et blatte américaine :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- faible infestation : 0,16 g/m<sup>2</sup> (4 gouttes)</li> <li>- forte infestation : 0,24 g/m<sup>2</sup> (6 gouttes)</li> </ul> <u>Fréquence d'application lors d'un traitement :</u> 1 application sur 4 semaines. Ne réappliquer le produit qu'une seule fois si l'infestation persiste. Ne pas appliquer plus de 12 gouttes par maison.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	Seringues en LDPE de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 g Cartouches en LDPE de 15, 20, 30, 35, 40 et 50 g

##### 4.2.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage

- Appliquer le produit biocide de manière ciblée uniquement dans les fissures et crevasses derrière les meubles ou appareils ménagers. Le produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces accessibles.
- Ne pas appliquer sur le bois ou les surfaces poreuses.

##### 4.2.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.
- Porter des gants pendant l'application.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Le produit ne doit pas être appliqué dans des zones accessibles aux enfants.
- Ne pas appliquer le produit sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux ou avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.
- Appliquer dans des zones difficilement accessibles, non susceptibles d'être lavées et totalement à l'abri de l'eau.

##### 4.2.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation



#### **4.2.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### **4.2.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

### **4.3. Description de l'usage**

**Tableau 3. Usage # 3 – Application du gel dans des boites d'appâts**

Type de produit	TP18
Le cas échéant, une description précise de l'usage autorisé	Insecticide
Organisme(s) cible(s) (y compris le stade de développement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)</li> <li>- Blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>)</li> <li>- Blatte américaine (<i>Periplaneta Americana</i>)</li> </ul> <p>Stades nymphes et adultes</p>
Domaine(s) d'utilisation	Intérieur
Méthode(s) d'application	Application de boites d'appâts
Dose(s) et fréquence(s) d'application	<p><u>Faible infestation :</u> 2 stations d'appât par pièce (5 g / 22m<sup>2</sup>)</p> <p><u>Forte infestation :</u> 4 stations d'appât par pièce (10 g / 22m<sup>2</sup>)</p> <p><u>Fréquence d'application lors d'un traitement :</u> 4 semaines après le début du traitement, les boites d'appât doivent être remplacées par des nouvelles boites d'appât si l'infestation persiste.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnels Non professionnels
Taille(s) et type(s) de conditionnement	Boîte d'appât en PET contenant 1 - 1,2 - 1,5 - 2 ou 2,5 g de gel

#### **4.3.1. Instructions d'utilisation spécifiques à l'usage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

#### **4.3.2. Mesures de gestion de risque spécifiques à l'usage**

- Les boites d'appât ne doivent pas être ouvertes ou manipulées.
- Ne jamais introduire les doigts dans les trous du piège.
- A la fin de la campagne de traitement, collecter les boîtes d'appât en vue de leur élimination.
- Ne pas disposer les boîtes d'appât sur des surfaces qui pourraient être en contact avec les animaux ou avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux de rente.



**4.3.3. Lorsque spécifique à l'usage, détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

**4.3.4. Lorsque spécifique à l'usage, instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

**4.3.5. Lorsque spécifique à l'usage, conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

Se référer aux conditions générales d'utilisation

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Instructions d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation, et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Déposer le produit à l'abri des rayons du soleil ou d'une source de chaleur (ex. ne pas le placer sous un radiateur).
- Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et autres mesures d'hygiène publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.).
- Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents.

### 5.2. Mesures de gestion de risque

- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou ne pas appliquer dans les zones déjà traitées avec un autre insecticide.

**5.3. Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement**

- En cas de contact avec la peau : laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

### 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (comme les insectes morts), dans un circuit de collecte approprié.
- A la fin de la campagne de traitement, collecter les boîtes d'appât en vue de leur élimination.
- Ne pas rejeter le produit non utilisé sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes...) ou dans les systèmes d'évacuation des eaux.



#### **5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales**

- Durée de vie : 4 ans.
- Stocker dans l'emballage commercial.
- Garder l'emballage fermé dans un endroit sec, frais et ventilé.
- Protéger du gel.

#### **6. Autre(s) information(s)**

- Le produit contient une substance amérisante.