

## Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'une matière fertilisante

---

*Vu le règlement (UE) 2019/515 du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.255-7 et R.255-17,*

*Vu l'arrêté du 1<sup>er</sup> avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation,*

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché par reconnaissance mutuelle de la matière fertilisante (produit simple) **BAYFOLAN AKTIVATOR***

*de la société*                      *BAYER SAS*

*enregistrée sous le*              *n°2024-0091*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 15 février 2024,*

*Considérant que les éléments déposés par la société BAYER SAS attestent que le produit BAYFOLAN AKTIVATOR a été légalement mis sur le marché en Autriche en tant que matière fertilisante,*

La mise sur le marché de la matière fertilisante désignée ci-après **est autorisée** en France selon les modalités d'autorisation précisées dans la présente décision et son annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### **Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**anses**

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE  
de l'alimentation, de l'environnement et du travail

| Informations générales |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit         | BAYFOLAN AKTIVATOR                                                                                                                        |
| Type de produit        | Produit de référence                                                                                                                      |
| Catégorie du produit   | Produit simple                                                                                                                            |
| Titulaire              | BAYER SAS<br>CS 90106<br>16 rue Jean-Marie Leclair<br>69266 LYON CEDEX 09<br>France                                                       |
| Classe - Type          | Matière fertilisante - Concentré soluble à base d'acides aminés et de peptides d'origine animale, d'acide fulvique et d'éléments minéraux |
| Etat physique          | Liquide                                                                                                                                   |
| Numéro d'intrant       | 003-2024.01                                                                                                                               |
| Numéro d'AMM           | 1240116                                                                                                                                   |

La présente autorisation est valable 10 ans à compter de la date de signature de la présente décision.

Le titulaire peut demander le renouvellement de l'autorisation, conformément à l'article R. 255-15 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation. Le dépôt d'une demande de renouvellement prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 06/03/2024

DocuSigned by:

*Charlotte Grastilleur*

AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE : Modalités d'autorisation de la matière fertilisante

| Teneurs garanties retenues (sur produit brut) |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Paramètres déclarables                        | Teneur |
| Matière sèche                                 | 60,5 % |
| Acides aminés libres totaux d'origine animale | 8 %    |
| Acides fulviques                              | 2 %    |
| Zinc (Zn)                                     | 1,2 %  |
| Manganèse (Mn)                                | 0,4 %  |
| Bore (B)                                      | 0,04 % |
| pH                                            | 5,5    |

| Classification du produit                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| La classification retenue est la suivante :                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Catégorie de danger                                                                                                                                                                           | Mention de danger                                                               |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                   | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques                              |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2                                                                                                                              | H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
| Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.</b> |                                                                                 |



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des cultures autorisées

### Utilisation comme matière fertilisante seule

| Cultures                                                     | Dose maximale par apport | Nombre maximal d'apports | Mode d'apport                                                            | Epoques d'apport / Stades d'application                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vigne (raisin de cuve et de table)                           | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                                                     | Tous les 7-10 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 89 (aux stades les plus critiques - par ex. : pousse 5 cm, floraison, nouaison et développement des fruits)  |
|                                                              | 6 L/ha                   | 6/an                     | Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte)                         | Tous les 7-10 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 89 (aux stades les plus critiques - par ex. : pousse 5 cm, floraison, nouaison et développement des fruits). |
| Arbres fruitiers (fruits à pépins et fruits à noyau)         | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                                                     | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 87 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, nouaison et développement des fruits)    |
|                                                              | 6 L/ha                   | 6/an                     | Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte)                         | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 87 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, nouaison et développement des fruits).   |
| Agrumes, fruits tropicaux et oliviers                        | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                                                     | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 87 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, nouaison et développement des fruits).   |
|                                                              | 6 L/ha                   | 6/an                     | Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte)                         | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 87 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, nouaison et développement des fruits).   |
| Légumes-fruits et légumineuses                               | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire<br>Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte) | Tous les 7-14 jours, du semis jusqu'à la maturation des fruits.                                                                                                   |
| Légumes-feuilles et crucifères                               | 3 L/ha                   | 6/an                     |                                                                          | Tous les 7-14 jours, au semis et pendant la croissance de la culture.                                                                                             |
| Légumes-racines à bulbes et à tiges (y compris les asperges) | 3 L/ha                   | 6/an                     |                                                                          | Tous les 7-14 jours, au semis et pendant la croissance de la culture.                                                                                             |



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des cultures autorisées

### Utilisation comme matière fertilisante seule

| Cultures                                                                                                                                                              | Dose maximale par apport | Nombre maximal d'apports | Mode d'apport                                                            | Epoques d'apport / Stades d'application                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomme de terre                                                                                                                                                        | 3 L/ha                   | 4/an                     | Application foliaire<br>Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte) | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 79 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison et développement des fruits).                                                 |
| Petits fruits et baies                                                                                                                                                | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                                                     | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 89 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, développement des fruits)                                                    |
| Avocat                                                                                                                                                                | 2 L/ha                   | 4/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 15 et BBCH 79 (aux stades les plus critiques - par ex. : germination, floraison, développement des fruits)                                                   |
| Riz                                                                                                                                                                   | 3 L/ha                   | 2/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 15 et BBCH 79 (aux stades les plus critiques - par ex. : transplantation, démarrage, floraison).                                                             |
| Colza                                                                                                                                                                 | 2 L/ha                   | 3/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 11 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison).                                          |
| Céréales (blé tendre et dur d'hiver, blé tendre et dur de printemps, orge d'hiver* et de printemps*, triticale d'hiver et de printemps, seigle, épeautre, avoine*...) | 2 L/ha                   | 4/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 11 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison).<br>(* BBCH 11 - BBCH 61 (orge / avoine). |
| Betterave                                                                                                                                                             | 2 L/ha                   | 3/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 15 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison)                                           |
| Tournesol                                                                                                                                                             | 2 L/ha                   | 3/an                     |                                                                          | Tous les 14 jours, entre les stades BBCH 11 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison)                                           |



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des cultures autorisées

### Utilisation comme matière fertilisante seule

| Cultures                                           | Dose maximale par apport | Nombre maximal d'apports | Mode d'apport                                    | Epoques d'apport / Stades d'application                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soja                                               | 2 L/ha                   | 3/an                     | Application foliaire                             | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 11 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison)   |
| Tabac                                              | 2 L/ha                   | 3/an                     |                                                  | Tous les 7-10 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison) |
| Maïs et sorgho                                     | 3 L/ha                   | 3/an                     |                                                  | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 11 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques - par ex. : établissement précoce des cultures, démarrage, floraison)   |
| Coton                                              | 3 L/ha                   | 3/an                     |                                                  | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 69                                                                                                        |
| Fruits à coque : amande, noisette, noix, châtaigne | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                             | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 87                                                                                                        |
|                                                    | 6 L/ha                   | 6/an                     | Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte) | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 87                                                                                                        |
| Kiwi                                               | 3 L/ha                   | 6/an                     | Application foliaire                             | Tous les 7-10 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 81                                                                                                      |
|                                                    | 6 L/ha                   | 6/an                     | Application au sol (arrosage ou goutte-à-goutte) | Tous les 7-10 jours entre les stades BBCH 00 et BBCH 81                                                                                                      |
| Lin                                                | 3 L/ha                   | 3/an                     | Application foliaire                             | Tous les 14 jours entre les stades BBCH 15 et BBCH 69 (aux stades les plus critiques)                                                                        |

## Conditions d'emploi du produit

### Stockage et manipulation du produit

Contient des oligo-éléments : à n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.

### Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Porter des gants et des vêtements de protection adaptés ainsi que des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés en fonction du type et du classement du produit.

Il est de la responsabilité du titulaire de l'autorisation d'indiquer avec précision, tant pour l'utilisateur professionnel que pour l'utilisateur non professionnel, le type d'EPI requis en fonction des tâches à effectuer, ainsi que leur gestion (utilisation, nettoyage, stockage).

**Pour les conditions d'utilisation non mentionnées dans cette annexe, se référer aux conditions de mise sur le marché dans l'Etat-membre susvisé.**