

## Décision relative à une demande de modification de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande de modification des conditions d'autorisation du produit phytopharmaceutique **KANTIK***

*de la société* ADAMA FRANCE SAS

*enregistrée sous le* n°2018-0070


*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 14 juin 2018,*

La modification de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est autorisée** en France pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et ses annexes.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### **Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.



Roger GENET

| Informations générales sur le produit |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Noms du produit                       | KANTIK<br>KROMATIK<br>VOLTAÏK                                             |
| Type de produit                       | Produit de référence                                                      |
| Titulaire                             | ADAMA FRANCE SAS<br>33 rue de Verdun,<br>92156 SURESNES,<br>France        |
| Formulation                           | Concentré émulsionnable (EC)                                              |
| Contenant                             | 150 g/L - fenprovidine<br>200 g/L - prochloraze<br>100 g/L - tébuconazole |
| Numéro d'intrant                      | 698-2014.01                                                               |
| Numéro d'AMM                          | 2170429                                                                   |
| Fonction                              | Fongicide                                                                 |
| Gamme d'usages                        | Professionnel                                                             |

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient. Les modalités d'autorisation du produit restent inchangées à l'exception de la modification des conditions d'emploi mentionnée en annexe de la présente décision.

A Maisons-Alfort, le

20 JUIL. 2019

Le Directeur Général

  
Roger GENET



## ANNEXE I : Modification des modalités de l'autorisation

| <b>Liste des usages concernés autorisés</b><br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                             |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---|
| Usages                                                                                                                                                     | Dose maximale d'emploi                                                                                      | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |   |
| 15103206<br>Avoine*Trt<br>Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                              | 1,3 L/ha                                                                                                    | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                | - |
|                                                                                                                                                            | Uniquement sur avoine de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |
| 15103206<br>Avoine*Trt<br>Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                              | 1,3 L/ha                                                                                                    | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20                                  | -                                                | -                                            | -                | - |
|                                                                                                                                                            | Uniquement sur avoine d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |
| 15103231<br>Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée                                                                                                         | 1,3 L/ha                                                                                                    | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                | - |
|                                                                                                                                                            | Uniquement sur avoine de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |
| 15103231<br>Avoine*Trt Part.Aer.*Rouille couronnée                                                                                                         | 1,3 L/ha                                                                                                    | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20                                  | -                                                | -                                            | -                | - |
|                                                                                                                                                            | Uniquement sur avoine d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |
| 00108034<br>Blé*Trt<br>Part.Aer.*Helminthosporiose                                                                                                         | 1,3 L/ha                                                                                                    | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                | - |
|                                                                                                                                                            | Uniquement sur céréales de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |   |

KANTIK

AMM n°2170429



## Liste des usages concernés autorisés

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                      | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH               | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00108034</b><br>Blé*Trt<br>Part.Aer.*Helminthosporiose                                                   | 1,3 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur céréales d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103209</b><br>Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                              | 1,3 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur céréales d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103209</b><br>Blé*Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                              | 1,3 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur céréales de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103214</b><br>Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s)                                                             | 1,3 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur céréales d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103214</b><br>Blé*Trt Part.Aer.*Rouille(s)                                                             | 1,3 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur céréales de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103221</b><br>Blé*Trt<br>Part.Aer.*Septoriose(s)                                                       | 1,6 L/ha               | 1/an                          | entre les stades<br>BBCH 31 et BBCH 59 | F<br>(BBCH 59)              | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur blé et épeautre.<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                        |                               |                                        |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |



## Liste des usages concernés autorisés

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                    | Dose maximale d'emploi                                                                                        | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15103221</b><br>Blé*Trt<br>Part.Aer.*Septoriose(s)                     | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur triticales d'hiver.<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.     |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103221</b><br>Blé*Trt<br>Part.Aer.*Septoriose(s)                     | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur triticales de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103226</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Helminthosporiose et ramulariose | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur orge de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.       |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103226</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Helminthosporiose et ramulariose | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur orge d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.            |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103225</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Oïdium(s)                        | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur orge de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.       |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103225</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Oïdium(s)                        | 1,3 L/ha                                                                                                      | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                           | Uniquement sur orge d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.            |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |

KANTIK

AMM n°2170429



## Liste des usages concernés autorisés

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                     | Dose maximale d'emploi                                                                                    | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15103229</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Rhynchosporiose   | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur orge de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103229</b><br>Orge*Trt<br>Part.Aer.*Rhynchosporiose   | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur orge d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103205</b><br>Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)           | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur orge de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103205</b><br>Orge*Trt Part.Aer.*Rouille(s)           | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 49 | F (BBCH 49)                 | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur orge d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103232</b><br>Seigle*Trt<br>Part.Aer.*Rhynchosporiose | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | 20 (dont DVP 5)                     | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur seigle de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

KANTIK

AMM n°2170429

## Liste des usages concernés autorisés

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                     | Dose maximale d'emploi                                                                                    | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15103232</b><br>Seigle*Trt<br>Part.Aer.*Rhynchosporiose | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur seigle d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103208</b><br>Seigle*Trt<br>Part.Aer.*Rouille(s)      | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur seigle de printemps<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>15103208</b><br>Seigle*Trt<br>Part.Aer.*Rouille(s)      | 1,3 L/ha                                                                                                  | 1/an                          | entre les stades BBCH 31 et BBCH 59 | F (BBCH 59)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                            | Uniquement sur seigle d'hiver<br>Une application par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.      |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.



## Conditions d'emploi du produit

### Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

#### *Protection de la faune*

La phrase :

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau.

Est remplacée par les phrases suivantes :

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur céréales à 1,6 L/ha et pour les usages sur céréales de printemps à 1,3 L/ha.
- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur céréales d'hiver à 1,3 L/ha.