

## Décision relative à une demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique et aux demandes associées

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu les demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché et d'extension d'usage majeur du produit phytopharmaceutique **ORTIVA***

*de la société SYNGENTA FRANCE SAS*

*enregistrées sous les n°2014-2120, 2014-2130 et 2012-1767*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 10 octobre 2018,*

*Vu le courrier de l'Anses du 25 février 2019 d'intention de retrait d'usages de l'autorisation de mise sur le marché du produit ORTIVA,*

*Vu la décision du Directeur général de l'Anses du 4 avril 2019,*

*Vu le recours gracieux formé le 11 avril 2019 par la société SYNGENTA FRANCE SAS,*

L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est renouvelée** en France pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et ses annexes.

La présente décision abroge et remplace la décision du 4 avril 2019 et s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.


| Informations générales sur le produit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noms du produit                       | ORTIVA<br>ZAKEO ONE<br>CONCLUDE AZT 250 SC<br>ORTIVA GOLD                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de produit                       | Produit de référence<br>(initialement deuxième gamme)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Titulaire                             | SYNGENTA FRANCE SAS<br>12 Chemin de l'Hobit<br>31790 Saint Sauveur<br>France                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formulation                           | Suspension concentrée (SC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contenant                             | 250 g/L - azoxystrobine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numéro d'intrant                      | 9700332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numéro d'AMM                          | 9700332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonction                              | Fongicide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gamme d'usage                         | Professionnel.<br>Mention « Amateur/emploi autorisé dans les jardins » retirée car non revendiquée lors du dépôt de dossier de réexamen. Le délai d'écoulement des stocks de produits dont l'étiquette porte cette mention, est de 6 mois à la commercialisation et de 12 mois supplémentaires à l'utilisation par des professionnels. |

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 31 décembre 2022.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort le, 25 AVR. 2019



**Françoise WEBER**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE I : Modalités d'autorisation du produit

### Vente et distribution

Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages :

| Emballage                                | Contenance        |
|------------------------------------------|-------------------|
| Bouteilles en polyéthylène haute densité | 1 L               |
| Bidons en polyéthylène haute densité     | 5 L ; 10 L ; 20 L |

### Classification du produit

La classification retenue est la suivante :

| Catégorie de danger                                                                                                                                                                           | Mention de danger                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                   | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques                                            |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1                                                                                                                              | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                  |                                                                                               |
| Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <b>Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.</b> |                                                                                               |

| <b>Liste des usages autorisés</b><br>En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                    |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Usages                                                                                                                                                                                                                                                       | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                             | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>14053203</b><br>Arbres et arbustes*<br>Trt Part.Aer.*Rouille(s)                                                                                                                                                                                           | 1 L/ha                                                                                                                                                             | 2/an                          | -                                   | Non applicable              | 20                                  | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.                                                                              |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 L/ha                                                                                                                                                             | 2/an                          | entre les stades BBCH 15 et BBCH 55 | 7                           | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
| <b>16103202</b><br>Artichaut*<br>Trt Part.Aer.*Mildiou(s)                                                                                                                                                                                                    | Uniquement sur artichaut.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 L/ha                                                                                                                                                             | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Uniquement sur cardon.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.    |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                          | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16103203</b><br>Artichaut*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 15 et BBCH 55 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
|                                                                         | Uniquement sur artichaut.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.              |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
| <b>16153203</b><br>Asperge*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes | Uniquement sur cardon.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                 |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 41 et BBCH 89 | F<br>(BBCH 89)              | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
|                                                                         | Application après récolte des turions.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                          | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |  |
| 16153201<br>Asperge*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                                                                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 41 et BBCH 89 | F<br>(BBCH 89)              | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Application après récolte des turions.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 16203203<br>Carotte*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                            |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 16203201<br>Carotte*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                          | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                            |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                              | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>19273201</b><br>Céleri-branch*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                       | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
| Uniquement sur céleri-branch et fenouil.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours sur céleri-branch et 10 jours sur fenouil.<br>3 applications par an et par culture. |                        |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>16361204</b><br>Chicorées - Production de chicons*Trt Sem. Plants*<br>Champignons (pythiacées)                                                                                   | 1 mL/m <sup>2</sup>    | 1/an                          | -                                   | 21                          | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sous abri.<br>Uniquement sur endive et pissenlit.                                                                                                                        |                        |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
| <b>16353205</b><br>Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                   | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                               |                        |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                       |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |  |
| 16353204<br>Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                               | 1 L/ha                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 16353203<br>Chicorées - Production de racines*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                                                                              | 1 L/ha                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 00516026<br>Choux à inflorescence*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                          | 1 L/ha                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 00516048<br>Choux feuillus*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                                 | 1 L/ha                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                 | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00517025</b><br>Choux pommés*<br>Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                       | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.                                                                                                                  |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16323205</b><br>Concombre*Trt Part.Aer.*<br>maladies des taches brunes                                                                                              | 0,8 L/ha               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16323204</b><br>Concombre*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                              | 0,8 L/ha               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16323203</b><br>Concombre*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                               | 0,8 L/ha               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                       |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| 17403200<br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*<br>Maladies diverses                                                                                                                                     | 1 L/ha                                                                                                                                                                | 3/an                          | -                        | Non applicable              | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 17403204<br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                            | 1 L/ha                                                                                                                                                                | 3/an                          | -                        | Non applicable              | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 17403202<br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                             | 1 L/ha                                                                                                                                                                | 3/an                          | -                        | Non applicable              | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                                                      | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>17403201</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise                                                                                                                   | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | Non applicable              | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Uniquement sur bulbes ornementaux.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403203</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                                                         | 1 L/ha                 | 3/an                          | -                                   | Non applicable              | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                       |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16823203</b><br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches foliaires                                                                                                                             | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sur <i>Stevia</i> .<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                              |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                          | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| 16823203<br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches foliaires                                                                                                                                                | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sous abri.<br>Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| 19153202<br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                   | Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                          |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sous abri.<br>Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                               | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                          | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16823201</b><br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                          | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
|                                                                                      | Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                          |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                      | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                                | -                                            | -                |
| <b>16823204</b><br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses | Uniquement sous abri.<br>Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                      | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                              | -                                            | -                |
|                                                                                      | Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                          |                               |                                     |                             |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                          | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| 16823204<br>Fines Herbes*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses                                                                                                                                           | 1 L/ha                                                                                                                                                                                          | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sous abri.<br>Egalement autorisé sur Stevia.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16553205<br>Fraisier*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                        | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                        | 3/an                          | entre les stades BBCH 51 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.                                                                                                           |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16853212<br>Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*<br>Anthracnose(s)                                                                                                                                                     | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                           |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15253201</b><br>Graines protéagineuses*<br>Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses                                    | 0,8 L/ha               | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16853218</b><br>Graines protéagineuses*<br>Trt Part.Aer.*Rouille(s)                                                                | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00518006</b><br>Haricots écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*Maladies des taches brunes                                                 | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 14                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00518012</b><br>Haricots écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*Rouille(s)                                                                 | 0,8 L/ha               | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 14                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

ORTIVA

AMM n°9700332

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                         | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                             | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00516012</b><br>Haricots et pois non écosés<br>frais*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                           | 1 L/ha                                                                                                                                                                             | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 7                           | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                | Uniquement sur haricots non écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                | 1 L/ha                                                                                                                                                                             | 2/an                          | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| <b>00516020</b><br>Haricots et pois non écosés<br>frais*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                           | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                           | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 7                           | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                | Uniquement sur haricots non écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                           | 2/an                          | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur pois non écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                                                                                                                                                                                    |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

ORTIVA

AMM n°9700332

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                          | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00517055</b><br>Infusions (séchées)*<br>Trt Part.Aer.*<br>Maladies fongiques | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                 | Uniquement sur infusions séchées de feuilles et de fleurs.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>L'usage sur infusions séchées de racines est refusé en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.<br>L'usage sous abri est refusé en raison d'un manque de données résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                 | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| <b>16703208</b><br>Laitue*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes          | Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                                                                                                                                       |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                 | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                 | Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                                                                                                              |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                 | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                        | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16603207</b><br>Laitue*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s) | 1 L/ha                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                        | Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                          |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                        | Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16603208</b><br>Laitue*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)  | 1 L/ha                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                        | Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                          |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 49 | 14                          | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                        | Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                  | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00517074</b><br>Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes         | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                         | Uniquement sur fève sèche, haricot sec, pois sec, pois chiche.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                  | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
| <b>00517066</b><br>Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses | Uniquement sur lentille sèche.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                 |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                         | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00517085</b><br>Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                  | 2/an                          | entre les stades BBCH 17 et BBCH 72 | 35                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                 | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| 16753201<br>Melon*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                                          | 0,8 L/ha                                                                                                                                                               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16753208<br>Melon*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                          | 0,8 L/ha                                                                                                                                                               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16753205<br>Melon*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                           | 0,8 L/ha                                                                                                                                                               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                              | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16773201</b><br>Navet*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                               | 0,8 L/ha               | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>Modification de la période d'application de BBCH 73 à 81 en BBCH 16 à 49 en cohérence avec les données résidus disponibles. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16053205</b><br>Oignon*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                              | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16803201</b><br>Oignon*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                              | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16803204</b><br>Oignon*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses                                                                                                      | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| <b>Liste des usages autorisés</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.                                                                    |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>16053201</b><br>Oignon*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                                                                                                                                                                     | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                                                                                                       |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00122009</b><br>Pavot*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches foliaires                                                                                                                                                                                                                   | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 60 et BBCH 69 | 42                          | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur pavot et œillette.<br>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>Augmentation du délai avant récolte de 21 jour à 42 jours en cohérence avec les données résidus disponibles. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00122007</b><br>Pavot*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                                                                                      | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 60 et BBCH 69 | 42                          | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sur pavot et œillette.<br>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>Augmentation du délai avant récolte de 21 jour à 42 jours en cohérence avec les données résidus disponibles. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                 | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 00122008<br>Pavot*Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/an                          | entre les stades BBCH 60 et BBCH 69 | 42                          | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                        | Uniquement sur pavot et œillette.<br>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>Augmentation du délai avant récolte de 21 jour à 42 jours en cohérence avec les données résidus disponibles. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16843203<br>Poireau*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes       | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 7                           | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                        | Uniquement sur oignon de printemps, ciboule et autres alliées comestibles.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 48 | 21                          | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                        | Uniquement sur poireau.<br>Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                                                                           |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| <b>Liste des usages autorisés</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                              | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>16843201</b><br>Poireau*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                 | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                              | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur oignon de printemps, ciboule et autres alliées comestibles.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                              | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 48 | 21                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| <b>16843202</b><br>Poireau*Trt Part.Aer.*<br>Rouille(s)                                                                                                                                                                 | Uniquement sur poireau.<br>Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                    |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                              | 3/an                          | entre les stades BBCH 14 et BBCH 48 | 7                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur oignon de printemps, ciboule et autres alliées comestibles.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>ORTIVA</b><br>AMM n°9700332                                                                                                                                                                                          | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                              | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 48 | 21                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur poireau.<br>Intervalle minimum entre les applications : 12 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                    |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| <b>Liste des usages autorisés</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>00517096</b><br>Pois écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                   | <b>0,8 L/ha</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2/an</b>                   | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont DVP 5)                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur pois écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage sur lentille fraîche est refusé en raison d'un manque d'essais résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00517097</b><br>Pois écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*Mildiou(s)                                                                                                                                                       | <b>0,8 L/ha</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2/an</b>                   | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont 5)                       | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur pois écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage sur lentille fraîche est refusé en raison d'un manque d'essais résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00517099</b><br>Pois écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                                                                        | <b>1 L/ha</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2/an</b>                   | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont 5)                       | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sur pois écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage sur lentille fraîche est refusé en raison d'un manque d'essais résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                        | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                        | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>00517100</b><br>Pois écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*<br>Pourriture grise et sclérotinioses | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/an                          | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont 5)                       | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                               | Uniquement sur pois écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage sur lentille fraîche est refusé en raison d'un manque d'essais résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00517102</b><br>Pois écosés frais*<br>Trt Part.Aer.*Rouille(s)                             | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                        | 2/an                          | entre les stades BBCH 51 et BBCH 69 | 14                          | 5<br>(dont 5)                       | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                               | Uniquement sur pois écosés frais.<br>Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage sur lentille fraîche est refusé en raison d'un manque d'essais résidus. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16863205</b><br>Poivron*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                       | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                               | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.                                                                                         |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages autorisés                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                       |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| 16863204<br>Poivron*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                        | 1 L/ha                                                                                                                                                                | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 16863203<br>Poivron*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                         | 0,8 L/ha                                                                                                                                                              | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>2 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 01141024<br>Pomme de terre*Trt Sol*<br>Champignons autres que pythiacées                                                                                                                                                | 3 L/ha                                                                                                                                                                | 1/an                          | BBCH 00                             | F<br>(BBCH 00)              | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Efficacité montrée sur rhizoctone brun.<br>Application dans la raie de plantation.<br>1 application tous les 2 ans.                                                   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| <b>Liste des usages autorisés</b>                                                                                                                                                                                                            |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.                      |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                                       | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>19483201</b><br>PPAM - non alimentaires*<br>Trt Part.Aer.*<br>Maladies fongiques                                                                                                                                                          | 1 L/ha                 | 2/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | -                           | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Également autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.                                                                                                                                                        |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16903201</b><br>Salsifis*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                                      | 1 L/ha                 | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 49 | 14                          | 20<br>(dont DVP 20)                 | -                                                | -                                            | -                |
| Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>Modification de la période d'application de BBCH 39 à 69 en BBCH 16 à 49 en cohérence avec les données résidus disponibles.                                                          |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16953207</b><br>Tomate*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes                                                                                                                                                                       | 0,8 L/ha               | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage en plein champ est retiré en raison d'un manque de données résidus. |                        |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| <b>Liste des usages autorisés</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                             |                                    |                                                 |                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                     |                             |                                    |                                                 |                                             |                  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                       | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traîée aquatique (mètres) | Zone Non Traîée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traîée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
| <b>16953201</b><br>Tomate*Trt Part.Aer.*<br>Mildiou(s)                                                                                                                                                                  | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                       | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | -                                  | -                                               | -                                           | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage en plein champ est retiré en raison d'un manque de données résidus. |                               |                                     |                             |                                    |                                                 |                                             |                  |
| <b>16953206</b><br>Tomate*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                   | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                                                     | 3/an                          | entre les stades BBCH 16 et BBCH 89 | 3                           | -                                  | -                                               | -                                           | -                |
|                                                                                                                                                                                                                         | Uniquement sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.<br>3 applications par an et par culture pour contrôler l'ensemble des maladies.<br>L'usage en plein champ est retiré en raison d'un manque d'essais résidus.   |                               |                                     |                             |                                    |                                                 |                                             |                  |

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.

| Liste des usages retirés                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                             |                                                |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Usages                                                                   | Dose d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre maximum d'applications | Délai avant récolte (jours) | Délai accordé pour la vente et la distribution | Délai accordé pour le stockage et l'utilisation des stocks |  |
| <b>16253201</b><br>Céleris*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes  | 0,8 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/an                          | 14                          | 4 octobre 2019                                 | 4 octobre 2020                                             |  |
|                                                                          | <b>Motivation du retrait :</b><br>L'usage est retiré puisque transitoire et déjà inclus dans les usages N°16203203 et N°19273201.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                             |                                                |                                                            |  |
| <b>16403201</b><br>Choux*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes    | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/an                          | 14                          | 4 octobre 2019                                 | 4 octobre 2020                                             |  |
|                                                                          | <b>Motivation du retrait :</b><br>L'usage est retiré puisque transformé en N°00516026, N°00516048 et N°00517025, mieux adaptés à la nature et au mode d'action du produit.<br>L'usage sur choux-raves est retiré en raison d'un manque d'essais résidus.                                                                                                                                          |                               |                             |                                                |                                                            |  |
| <b>16563205</b><br>Haricots*Trt Part.Aer.*<br>Maladies des taches brunes | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/an                          | 7                           | 4 octobre 2019                                 | 4 octobre 2020                                             |  |
|                                                                          | <b>Motivation du retrait :</b><br>L'usage est retiré puisque transitoire et transformé en N°00518006, N°00516012 et N°00517074, mieux adaptés à la nature et au mode d'action du produit.                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                                                |                                                            |  |
| <b>19993200</b><br>PPAMC*Trt Part.Aer.*<br>Maladies fongiques            | 1 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/an                          | 14                          | 4 octobre 2019                                 | 4 octobre 2020                                             |  |
|                                                                          | <b>Motivation du retrait :</b><br>L'usage est retiré puisque transformé en N°16823203, N°19153202, N°16823201, N°16823204, N°00517055, N°19483201, N°00122007, N°00122008 et N°00122009, mieux adaptés aux revendications.<br>L'usage Epices*Trt Part.Aer.*Maladies fongiques est retiré en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus ou d'un manque de données résidus. |                               |                             |                                                |                                                            |  |

## Conditions d'emploi du produit

### Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

#### *Pour l'opérateur, porter*

##### **Dans le cadre d'une application à l'aide d'un pulvérisateur à rampe**

###### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

###### **• pendant l'application - pulvérisation vers le bas**

###### *Si application avec tracteur avec cabine*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

###### *Si application avec tracteur sans cabine*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation

###### **• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

##### **Dans le cadre d'une application à l'aide d'une lance**

###### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

- **pendant l'application : sans contact intense avec la végétation**

*Culture basse (< 50 cm)*

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

*Culture haute (> 50 cm)*

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN 143) ou A2P3 (EN 14387) en cas d'exposition aux embruns de pulvérisation ;

- **pendant l'application : contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN 143) ou A2P3 (EN 14387) en cas d'exposition aux embruns de pulvérisation ;

- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

***Pour le travailleur, porter***

- Une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35%/65% - grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup>) avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.

***Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017***

- 6 heures pour les usages en plein champ et 8 heures pour les applications en milieu fermé.

**Respect des limites maximales de résidus (LMR)**

- Ne pas utiliser les sous-produits des PPAM non alimentaires en alimentation humaine ou animale.
- Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

**Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

***Protection de l'eau***

- SPE 1 : Pour protéger les eaux souterraines, suite à une utilisation sur pomme de terre, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de l'azoxystrobine plus d'une fois tous les deux ans.
- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

### Protection de la faune

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit plus d'une fois par an sur sol artificiellement drainé ayant une teneur en argile supérieure ou égale à 45 % pour les usages sur "graines protéagineuses" d'hiver.
- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit plus d'une fois par an sur sol artificiellement drainé pour les usages sur "graines protéagineuses" de printemps, "haricots écosés frais", "haricots et pois non écosés frais", "légumineuses potagères sèches" et "pois écosés frais".
- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé pour les usages sur pomme de terre, "artichaut", "chicorées-production de racines", "choux à inflorescence", "choux pommés", "choux feuillus", cultures florales et plantes vertes, fines herbes, "oignon", "poireau", infusions, "laitues" et PPAM non alimentaires.
- SPe 3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur pomme de terre et "pavot".
- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 m par rapport aux points d'eau pour les usages sur "arbres et arbustes d'ornement".
- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur "artichaut", asperge, "carottes", "chicorées-production de racines", "céleri-branché", "choux à inflorescence", "choux pommés", "choux feuillus", "concombres", "cultures florales et plantes vertes", "fines herbes", fraises, "melon", "navet", "poivron", "oignon", "poireau", "salsifis", infusions, "laitues" et PPAM non alimentaires.
- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur "graines protéagineuses d'hiver et de printemps", "haricots écosés frais", "haricots et pois non écosés frais", "légumineuses potagères sèches", "pois écosés frais".

Le produit peut être utilisé sur les usages autorisés, conformément aux conditions d'emploi antérieures à la présente décision pendant une période de 6 mois.

### Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

| Détail de la demande post autorisation                                                                                                                                                                                                                                      | Délai (mois) | Réurrence (mois) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Mettre en place un suivi de la résistance à l'azoxystrobine pour les mildious et les oïdiums de la "tomate", du "concombre" et de la "laitue".<br>Fournir, aux autorités compétentes, toute nouvelle information susceptible de modifier l'analyse du risque de résistance. | -            |                  |

## Recommandations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Préciser la sensibilité des cultures ornementales.