

## Décision relative à une demande d'extension d'usages d'un produit phytopharmaceutique

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande d'extension d'usages majeurs du produit phytopharmaceutique **TAKUMI***

*de la société                      NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH*

*enregistrée sous le            n°2015-0956*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 15 décembre 2017,*

L'autorisation de mise sur le marché du produit référencé ci-après **est étendue** aux usages décrits dans la présente décision.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### **Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

| Informations générales sur le produit |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                        | TAKUMI                                                                           |
| Type de produit                       | Produit de référence                                                             |
| Titulaire                             | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH<br>Berliner Allee 42<br>40212 DUSSELDORF<br>ALLEMAGNE |
| Formulation                           | Suspension concentrée (SC)                                                       |
| Contenant                             | 100 g/L - cyflufénamide                                                          |
| Numéro d'intrant                      | 2110258                                                                          |
| Numéro d'AMM                          | 2130079                                                                          |
| Fonction                              | Fongicide                                                                        |
| Gamme d'usage                         | Professionnel                                                                    |

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort le, 23 OCT. 2018



**Françoise WEBER**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE I : Modalités d'autorisation du produit

| Liste des nouveaux usages autorisés                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|
| En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.<br>En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage. |                                                                                                                                                                |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| Usages                                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                         | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |  |
| 14053204<br>Arbres et arbustes*<br>Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                                                                              | 0,15 L/ha                                                                                                                                                      | 2/an                          | entre les stades BBCH 40 et BBCH 75 | Non applicable              | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Egalement autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours                                                                          |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 16103203<br>Artichaut*<br>Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                                                                                       | 0,15 L/ha                                                                                                                                                      | 2/an                          | entre les stades BBCH 40 et BBCH 75 | 21                          | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Intervalle minimum entre les applications : 14 jours.<br>Modification du délai avant récolte de 14 jours à 21 jours conformément aux données résidus fournies. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |
| 17403202<br>Cultures florales et plantes vertes*<br>Trt Part.Aer.*Oïdium(s)                                                                                                                                             | 0,15 L/ha                                                                                                                                                      | 2/an                          | entre les stades BBCH 40 et BBCH 75 | Non applicable              | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | Egalement autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.                                                                         |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |  |

### Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                                                                                                                                                                                                                                                      | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH                  | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16553205</b><br>Fraisier*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                                                     | 0,15 L/ha              | 2/an                          | entre les stades<br>BBCH 20 et<br>BBCH 89 | 3                           | 5                                   | -                                                | -                                            | -                |
| Egalement autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.                                                                                                                                                                      |                        |                               |                                           |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17303203</b><br>Rosier*Trt Part.Aer.*<br>Oïdium(s)                                                                                                                                                                                                       | 0,15 L/ha              | 2/an                          | entre les stades<br>BBCH 40 et<br>BBCH 75 | Non applicable              | -                                   | -                                                | -                                            | -                |
| Uniquement autorisé sous abri.<br>Intervalle minimum entre les applications : 10 jours.<br>L'usage en plein champ est refusé au motif que les données fournies ne permettent pas d'exclure un risque d'effet nocif par contamination des eaux souterraines. |                        |                               |                                           |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

## Conditions d'emploi du produit

### Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

#### **Pour l'opérateur, porter**

**Dans le cadre d'une application à l'aide d'une lance :**

##### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

**OU**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

##### **• pendant l'application :**

*sans contact intense avec la végétation, culture basse (< 50 cm)*

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

*sans contact intense avec la végétation, culture haute (> 50 cm)*

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

*contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses*

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

##### **• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

**OU**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

**Dans le cadre d'une application à l'aide d'un pulvérisateur à rampe :**

**• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

**• pendant l'application**

*Si application avec tracteur avec cabine*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

*Si application avec tracteur sans cabine*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

**• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

***Pour le travailleur, porter***

- Porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35 %/65 % - grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup>) avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.

***Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :***

- 6 heures en plein champ, 8 heures en milieu fermé

**Respect des limites maximales de résidus (LMR)**

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

**Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

***Protection de la faune***

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

## Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

| Détail de la demande post autorisation                                                                  | Délai (mois) | Réurrence (mois) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Mettre en place un suivi de la résistance au cyflufenamide pour l'oïdium du fraisier et de l'artichaut. | -            | -                |