

Maisons-Alfort, le 26/06/2017

Conclusions de l'évaluation **relatives à une demande d'autorisation de mise sur le marché** **pour la préparation CLOSER,** **à base de sulfoxaflor,** **de la société Dow AgroScience S.A.S.**

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux. Le présent document ne constitue pas une décision.

PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier, déposé par la société Dow AgroScience S.A.S., relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché pour la préparation CLOSER pour un emploi par des utilisateurs professionnels.

La préparation CLOSER est un insecticide à base de 120 g/L de sulfoxaflor¹ se présentant sous la forme d'une suspension concentrée (SC), appliquée en pulvérisation. Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) sont mentionnés en annexe 1.

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour cette préparation, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1107/2009², de ses règlements d'application et de la réglementation nationale en vigueur.

Cette préparation a été évaluée par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés dans le cadre d'une procédure interzonale intégrant la participation de l'Irlande, de la Pologne et de la République Tchèque pour l'ensemble des Etats membres de l'Europe. L'évaluation tient compte des usages pire-cas (principe du risque enveloppe³). Dans le cas où des mesures d'atténuation du risque sont proposées, elles sont adaptées aux usages revendiqués en France.

L'évaluation a donné lieu à la rédaction d'un « Registration Report » soumis à commentaire auprès des Etats membres et du demandeur avant finalisation et validation par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés.

Les conclusions de l'évaluation ci-dessous se rapportent à la partie A du « Registration Report » (en langue anglaise). C'est une synthèse de la demande d'autorisation, des résultats de l'évaluation et des conditions de l'autorisation proposée, que l'Agence rend publique sur son site internet.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides, soit au niveau européen, soit par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés.

¹ Règlement d'exécution (UE) 2015/1295 de La Commission du 27 juillet 2015 portant approbation de la substance active «sulfoxaflor», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission

² Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

³ SANCO document "risk envelope approach", European Commission (14 March 2011). Guidance document on the preparation and submission of dossiers for plant protection products according to the "risk envelope approach"; SANCO/11244/2011 rev. 5

Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°546/2011⁴. Lorsque des données complémentaires sont identifiées, celles-ci sont détaillées à la fin de la conclusion.

Après consultation du Comité d'experts spécialisé "Produits phytopharmaceutiques : substances et préparations chimiques", réuni le 7 juin 2017, et de l'ensemble des Etats membres de l'Europe, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011, sur les conclusions de l'évaluation européenne des substances actives, sur les données soumises par le demandeur et évaluées dans le cadre de cette demande, les commentaires des Etats membres de l'Europe ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés estime que :

- A.** Les caractéristiques physico-chimiques de la préparation CLOSER ont été décrites et sont considérées comme conformes dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

Les méthodes d'analyse sont considérées comme conformes.

L'estimation des expositions⁵, liées à l'utilisation de la préparation CLOSER pour les usages revendiqués, est inférieure à l'AOEL⁶ du sulfoxaflor pour les opérateurs⁷, les personnes présentes⁸ et les travailleurs⁹, dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

Les usages revendiqués sur limette, chou vert, haricot, mâche, scarole, roquette, cresson, cresson de terre, moutarde brune, feuilles et pousses de brassica, autres salades, pourpier, feuilles de bette, salicorne et pois sont susceptibles d'entraîner un dépassement des LMR¹⁰ en vigueur.

En ce qui concerne l'usage revendiqué sur prunier et graines protéagineuses, le respect des LMR en vigueur ne peut pas être vérifié en raison d'un manque d'essais résidus.

Les niveaux de résidus mesurés et la distribution des résultats indiquent que, aux bonnes pratiques agricoles¹¹ revendiquées, les usages oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, cerisier, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, chou pommé, chou chinois, concombre, melon, tomate, poivron, laitue, épinard, pomme de terre, pommier et pêcher n'entraînent pas de dépassement des LMR en vigueur. Toutefois, afin de répondre aux requis réglementaires, des essais supplémentaires sont demandés sur pommier, pêcher et mandarinier ou citronnier.

⁴ Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

⁵ Une estimation additionnelle des expositions a été conduite avec le modèle EFSA (EFSA Journal 2014;12(10):3874) et les conclusions de l'évaluation ne sont pas modifiées.

⁶ AOEL : (Acceptable Operator Exposure Level ou niveau acceptable d'exposition pour l'opérateur) est la quantité maximale de substance active à laquelle l'opérateur peut être exposé quotidiennement, sans effet dangereux pour sa santé.

⁷ Opérateur/applicateur : personne participant à des activités en rapport avec l'application d'un produit phytopharmaceutique, telles que le mélange, le chargement, l'application, ou avec le nettoyage et l'entretien d'un équipement contenant un produit phytopharmaceutique. Ce peut être un professionnel ou un amateur.

⁸ Personne présente : personne se trouvant fortuitement dans un espace où un produit phytopharmaceutique est ou a été appliqué, ou dans un espace adjacent, à une fin autre que celle de travailler dans l'espace traité ou avec le produit traité.

⁹ Travailleur : toute personne qui, dans le cadre de son travail, pénètre dans une zone ayant préalablement été traitée avec un produit phytopharmaceutique ou manipule une culture traitée avec un produit phytopharmaceutique.

¹⁰ La limite maximale applicable aux résidus (LMR) est la concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au règlement (CE) N°396/2005, sur la base des bonnes pratiques agricoles et de l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables.

¹¹ Au sens du règlement (CE) N°396/2005

Les niveaux estimés des expositions aiguë et chronique pour le consommateur, liés à l'utilisation de la préparation CLOSER, sont inférieurs respectivement à la dose de référence aiguë¹² et à la dose journalière admissible¹³ de la substance active.

Les cultures florales, les plantes vertes, les arbres et arbustes, les plantes d'intérieur et de balcon et les rosiers n'étant pas destinés à l'alimentation humaine ou animale, l'évaluation des niveaux de résidus et du risque alimentaire liés aux usages sur ces cultures n'est pas nécessaire.

Pour les usages plein champ, les concentrations estimées dans les eaux souterraines en substance active et ses métabolites, liées à l'utilisation de la préparation CLOSER, sont inférieures aux valeurs seuils définies dans le règlement (UE) n°546/2011 et le document guide SANCO/221/2000¹⁴.

Pour les usages sous serre, les calculs d'exposition des eaux souterraines à la substance active et ses métabolites ne sont pas requis.

Les niveaux d'exposition estimés pour les espèces non-cibles, terrestres et aquatiques, liés à l'utilisation de la préparation CLOSER, sont inférieurs aux valeurs de toxicité de référence pour chaque groupe d'organismes, dans les conditions d'emploi précisées ci-dessous.

- B.** Le niveau d'efficacité de la préparation CLOSER est considéré comme satisfaisant pour tous les usages revendiqués.

Le niveau de phytotoxicité de la préparation CLOSER est considéré comme négligeable pour l'ensemble des usages revendiqués.

Les risques d'impact négatif sur le rendement, la qualité, la fabrication du cidre et la multiplication sont considérés comme négligeables.

Les risques d'impact négatif sur les cultures suivantes et les cultures adjacentes sont considérés comme négligeables.

Il existe un risque d'apparition ou de développement de résistance vis-à-vis du sulfoxaflor pour les pucerons (*Myzus persicae*, *Aphis gossypii* et *Dysaphis plantaginea*) et les aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* et/ou *Bemisia tabaci*) nécessitant une surveillance sur cultures légumières, pomme de terre et cultures fruitières.

CONCLUSIONS

En résumé, la conformité ou l'absence de conformité aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011 est indiquée, usage par usage et sous réserve des conditions d'emploi décrites ci-après, dans le tableau suivant.

¹² La dose de référence aiguë (ARfD) d'un produit chimique est la quantité estimée d'une substance présente dans les aliments ou l'eau de boisson, exprimée en fonction du poids corporel, qui peut être ingérée sur une brève période, en général au cours d'un repas ou d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

¹³ La dose journalière admissible (DJA) d'un produit chimique est une estimation de la quantité de substance active présente dans les aliments ou l'eau de boisson qui peut être ingérée tous les jours pendant la vie entière, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation. Elle est exprimée en milligrammes de substance chimique par kilogramme de poids corporel (OMS, 1997).

¹⁴ Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under Council directive 91/414/EEC. SANCO/221/2000-rev10-final, 25 February 2003.

I. Résultats de l'évaluation pour les usages revendiqués par le demandeur pour une autorisation de mise sur le marché de la préparation CLOSER

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ¹⁵)	Conclusion (b)
12053101 – Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,4 L/ha	1	-	BBCH 30-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier Non conforme limette (dépassement de LMR)
12053106 – Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 30-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier Non conforme limette (dépassement de LMR)
00206014 – Cerisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,4 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12203102 – Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha 0,3 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12553108 – Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles Portée de l'usage : pêcher et nectarinier	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12553122 – Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons Portée de l'usage : pêcher et nectarinier	0,2 L/ha 0,3 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12603149 – Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,40 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme

¹⁵ Le délai avant récolte (DAR) est le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture ; ce délai peut être défini soit en jours, soit par le stade de croissance de la culture lors de la dernière application (on parle alors de DAR F).

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ¹⁵)	Conclusion (b)
12603150 – Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons (autres que lanigère)	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12603163 – Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère	0,40 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
12653112 – Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours	Non conforme (Essais résidu insuffisants)
12653110 – Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha 0,30 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours	Non conforme (Essais résidu insuffisants)
16403101 – Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme brocoli, chou de Bruxelles, chou chinois, chou-fleur, chou pommé Non conforme chou vert (dépassement de LMR)
16323103 – Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
16323106 – Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha	2	7 jours	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
16563105 – Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours	Non conforme (Dépassement de LMR)

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ¹⁵)	Conclusion (b)
16603101 – Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme laitue Non conforme mâche, scarole, roquette, cresson, cresson de terre, moutarde brune, feuilles et pousses de brassica, autres salades (dépassement de LMR)
16503102 – Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme uniquement sur épinard Non conforme pourpier et feuilles de bette (dépassement de LMR)
16753103 – Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison)	1 jour	Conforme
16753102 – Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison)	1 jour	Conforme
16853102 – Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours	Non conforme (Dépassement de LMR)
16863103 – Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
16863104 – Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha	2	7 jours	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ¹⁵)	Conclusion (b)
15653108 – Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	21 jours	BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-95 (ne pas appliquer en période de floraison)	7 jours	Conforme
16953101 – Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
16953104 – Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2	7 jours	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
01002019 – Arbres et arbustes – Trt Part.Aer. *Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
14053105 – Arbres et arbustes*Trt Part.Aer. *Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2	7 jours	<i>plein champ</i> BBCH 20-59 (préfloraison) BBCH 69-87 (ne pas appliquer en période de floraison) <i>sous abri</i> BBCH 20-87	1 jour	Conforme
17403102 – Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Conforme
17403104 – Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2	7 jours -	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Conforme

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ¹⁵)	Conclusion (b)
00701017 – Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Non pertinent (usage non professionnel)
00701020 – Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Non pertinent (usage non professionnel)
17303117 – Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Conforme
17303108 – Rosier*Trt Part.Aer.* Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-59 (préfloraison)	1 jour	Conforme
16853119 – Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours	Non conforme (absence d'essais résidus respectant la BPA revendiquée)

Les lignes grisées dans le tableau signalent que l'évaluation conduit à identifier un risque ou bien que l'efficacité biologique n'a pas été démontrée. Dans la colonne « conclusion », est signalé le domaine de l'évaluation concerné.

- (a) Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, JORF du 30 mars 2014.
- (b) La conformité fait référence aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011. Sauf mention explicite, cette conformité porte sur la culture de référence définie dans le catalogue. La compatibilité des LMR des cultures rattachées par le catalogue a été vérifiée. L'évaluation est non finalisée en l'absence ou par manque de données satisfaisant les critères d'évaluation.
- (c) Nombre d'applications pour un cycle cultural par an ou à une fréquence indiquée dans les conditions d'emploi et par parcelle.
- (d) Sur la base d'un volume de bouillie de 1000 L/ha

II. Classification de la préparation CLOSER

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 ¹⁶	
Catégorie	Code H
Sans classement pour la santé humaine	
Danger chronique pour le milieu aquatique, catégorie 2	H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur	

Cette classification doit être prise en compte pour l'étiquetage du produit ainsi que pour tout document d'information sur le produit.

L'étiquette devra porter la mention suivante :

« EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. »

La classification de la substance active est rappelée en annexe 2.

¹⁶ Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

III. Conditions d'emploi

Les conditions d'emploi précisées ci-dessous sont issues de l'évaluation et de mesures de prévention, pour chaque section du dossier pour laquelle l'usage revendiqué pourrait ainsi être considéré comme conforme. Il convient de les reprendre et/ou de les adapter au regard des usages qui seront effectivement accordés.

- **Pour l'opérateur¹⁷**, porter :
 - o Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique
 - **pendant le mélange/chargement**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
 - **pendant l'application**
 - Si application avec tracteur avec cabine*
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;
 - Si application avec tracteur sans cabine*
 - Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;
 - **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- o Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe
- **pendant le mélange/chargement**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- **pendant l'application**
 - Si application avec tracteur avec cabine*
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;
 - Si application avec tracteur sans cabine*
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;
- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;

¹⁷ sur la base de l'estimation des expositions et des mesures de prévention des risques proposées par le demandeur et vérifiées par l'Anses.

- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance (usage sous abri)
- **pendant le mélange/chargement**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;
- OU
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- **pendant l'application : sans contact intense avec la végétation**
 - Culture basse (< 50 cm)**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
 - Culture haute (> 50 cm)**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
 - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- **pendant l'application : contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
 - Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;
- OU
 - Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
 - Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
 - EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- **Pour le travailleur¹⁸**, porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35%/65% - grammage d'au moins 230 g/m²) avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.
- **Délai de rentrée¹⁹** : 6 heures en plein champ ou 8 heures sous serre.
- **SP 1** : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. (Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. /Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes).
- **SPe 3** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée²⁰ de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
- **SPe 3** : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages vergers, agrumes.

¹⁸ sur la base de l'estimation des expositions et des mesures de prévention des risques proposées par le demandeur et vérifiées par l'Anses.

¹⁹ Le délai de rentrée est la durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans les lieux où a été appliqué un produit.

²⁰ Une zone non traitée (ZNT) est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau (correspondant pour les cours d'eau – en dehors des périodes de crues- à la limite de leur lit mineur) et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage.

- **SPe 3** : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages plantes ornementales dont la taille est supérieure à 50 cm.
- **SPe 8** : Dangereux pour les abeilles/Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats/Ne pas utiliser en présence d'abeilles/Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes/Ne pas appliquer à partir de 5 jours avant le début de la floraison pour les applications en préfloraison.

Pour les usages sous abri :

- Peut porter atteinte à la faune auxiliaire et aux insectes pollinisateurs. Eviter toute exposition inutile.
- **Limites maximales de résidus** : se reporter aux LMR définies au niveau de l'Union européenne²¹.
- **Délai(s) avant récolte**²² :
 - o Tomate, poivron, concombre, melon : 1 jour ;
 - o Oranger, citronnier, pamplemoussier, mandarinier, pêcher, pommier, cerisier, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, chou chinois, chou-pommé, laitue, épinard, pomme de terre : 7 jours

Recommandations de la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés pour réduire les expositions

Il convient de rappeler que l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.

En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI²³ doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Emballages

- o Bouteille en PEHD²⁴ (0,25 L, 0,5 L, 1 L, 2 L)
- o Bidons en PEHD (3 L, 5 L, 10 L, 20 L)
- o Bouteilles en PET²⁵ (0,25 L, 0,5 L, 1 L, 2 L)
- o Bidons en PET (3 L, 5 L, 10 L, 20 L)

²¹ Règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JOUE du 16/03/2005) et règlements modifiant ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I.

²² Le délai avant récolte (DAR) est le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture ; ce délai peut être défini soit en jours, soit par le stade de croissance de la culture lors de la dernière application (on parle alors de DAR F).

²³ EPI : équipement de protection individuelle

²⁴ Polyéthylène Haute densité

²⁵ Polyéthylène téréphtalate

IV. Données post-autorisation

Les éléments mentionnés, pour information, dans la liste ci-dessous, concernent exclusivement les sections pour lesquelles l'usage revendiqué pourrait être considéré comme conforme, le cas échéant dans des conditions d'emploi adaptées. Les données qui permettraient éventuellement de conduire à la conformité d'un usage indiqué comme « non conforme » dans le tableau 1 ne figurent pas dans cette liste.

Il conviendrait de fournir dans un délai de 24 mois :

- L'étude de stockage deux ans à température ambiante.
- Deux essais résidus complémentaires sur pommier réalisés respectivement en zone nord et en zone sud.
- Deux essais résidus complémentaires réalisés en zone sud sur pêcher.
- Deux essais résidus complémentaires réalisés en zone sud sur mandarinier ou citronnier.

V. Données de surveillance

- Il conviendrait de mettre en place un suivi de la résistance au sulfoxaflor (un seul suivi toutes préparations confondues) pour *Myzus persicae* sur cultures légumières ou pomme de terre, pour *Myzus persicae* sur cultures fruitières, pour le puceron cendré du pommier (*Dysaphis plantaginea*), pour *Aphis gossypii* sur concombre et pour les aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum* et/ou *Bemisia tabaci*) sur cultures légumières.
- Il conviendrait de fournir immédiatement à l'Anses toute nouvelle information susceptible de modifier l'analyse de risque de résistance.
- Il conviendrait dans tous les cas de fournir au moment du renouvellement de la préparation un bilan des résultats de la surveillance mise en place.

VI. Données identifiées comme manquantes sur la substance active et ses métabolites

Les données qui ont été identifiées comme manquantes dans le cadre de l'évaluation européenne sont détaillées dans les conclusions de l'EFSA et le « review report ».

Il est à noter que le Règlement d'exécution (UE) 2015/1295 indique que le demandeur présente des informations confirmatives concernant le risque pour les abeilles et les autres pollinisateurs.

Annexe 1

**Usage(s) revendiqué(s) par le demandeur pour une autorisation de mise sur le marché
de la préparation CLOSER**

Substance(s) active(s)	Composition de la préparation	Dose(s) maximale(s) de substance active
Sulfoxaflor	120 g/L	24 g sa/ha à 48 g sa/ha

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR) ²⁶
12053101 – Agrumes*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,4 L/ha	1	-	BBCH 30-85	7 jours
12053106 – Agrumes*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 30-85	7 jours
00206014 – Cerisier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,4 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12203102 – Cerisier*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha 0,3 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12553108 – Pêcher*Trt Part.Aer.*Cochenilles Portée de l'usage : pêcher et nectarinier	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12553122 – Pêcher*Trt Part.Aer.*Pucerons Portée de l'usage : pêcher et nectarinier	0,2 L/ha 0,3 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12603149 – Pommier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,40 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12603150 – Pommier*Trt Part.Aer.*Pucerons (autres que lanigère)	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12603163 – Pommier*Trt Part.Aer.*Puceron lanigère	0,40 L/ha	1	-	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12653112 – Prunier*Trt Part.Aer.*Cochenilles	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
12653110 – Prunier*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha 0,30 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 51-59 (préfloraison) BBCH 69-85	7 jours
16403101 – Choux*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49	7 jours
16323103 – Concombre*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-87	1 jour
16323106 – Concombre*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 20-87	1 jour
16563105 – Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours
16603101 – Laitue*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49	7 jours
16503102 – Epinard*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	1	-	BBCH 20-49	7 jours
16753103 – Melon*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 20-87	1 jour

²⁶ Le délai avant récolte (DAR) est le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture ; ce délai peut être défini soit en jours, soit par le stade de croissance de la culture lors de la dernière application (on parle alors de DAR F).

Usage(s) correspondant au catalogue des usages en vigueur au 1 ^{er} avril 2014 (a)	Dose maximale d'emploi de la préparation	Nombre maximal d'applications (c)	Intervalle entre applications	Stade d'application	Délai avant récolte (DAR ²⁶)
16753102 – Melon*Trt Part.Aer.*Aleurodes	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-87	1 jour
16853102 – Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours
16863103 – Poivron*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-87	1 jour
16863104 – Poivron*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha	2	7 jours	BBCH 20-87	1 jour
15653108 – Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,20 L/ha	2	21 jours	BBCH 20-95	7 jours
16953101 – Tomate*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous abri)	0,20 L/ha 0,40 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-87	1 jour
16953104 – Tomate*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous abri)	0,2 L/ha	1	7 jours	BBCH 20-87	1 jour
01002019 – Arbres et arbustes – Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 20-87	1 jour
14053105 – Arbres et arbustes*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-59	1 jour
00504002 – Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59	1 jour
17402103 – Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha	2	7 jours -	BBCH 12-59	1 jour
00701017 – Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59	1 jour
00701020 – Plantes d'intérieur et balcons*Trt Part.Aer.*Pucerons (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-59	1 jour
17303117 – Rosier*Trt Part.Aer.*Aleurodes (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha 0,4 L/ha	2 1	7 jours -	BBCH 12-59	1 jour
17303108 – Rosier*Trt Part.Aer.* Pucerons (Plein champ et sous serre)	0,2 L/ha	2	7 jours	BBCH 12-59	1 jour
16853119 – Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons	0,2 L/ha	2	21 jours	BBCH 40-85	14 jours

Annexe 2

Classification de la substance active

Substance (Référence)	Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 ²⁷	
	Catégorie	Code H
Sulfoxaflor (Reg. (CE) n°1272/2008)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4	H302 Nocif en cas d'ingestion
	Danger aigu pour le milieu aquatique, catégorie 1	H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
	Danger chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1	H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

²⁷ Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.