

REGISTRATION REPORT

Part A

Risk Management

Product code: CE-10239-I

Product name: ERADICOAT MAX

Chemical active substance:

maltodextrin, 476 g/L

Southern Zone

Zonal Rapporteur Member State: France

NATIONAL ASSESSMENT FRANCE

label extension according to Art. 51

-

Minor uses

Applicant: Certis Europe B.V.

Date: 30 December 2021

Table of Contents

1	DETAILS OF THE APPLICATION.....	3
1.1	APPLICATION BACKGROUND.....	3
1.2	ACTIVE SUBSTANCE APPROVAL.....	3
1.3	REGULATORY APPROACH	4
1.4	DATA PROTECTION CLAIMS	4
1.5	LETTER(S) OF ACCESS	5
2	DETAILS OF THE AUTHORISATION	5
2.1	PRODUCT IDENTITY	5
2.2	CLASSIFICATION AND LABELLING.....	5
2.2.1	<i>Classification and labelling under Directive 99/45/EC</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Classification and labelling in accordance with Regulation (EC) No1272/2008</i>	<i>5</i>
2.2.3	<i>Other phrases in compliance with Regulation (EU) No 547/2011</i>	<i>5</i>
2.2.4	<i>Other phrases linked to the preparation</i>	<i>5</i>
2.3	PRODUCT USES.....	6
3	RISK MANAGEMENT.....	15
3.1	REASONED STATEMENT OF THE OVERALL CONCLUSIONS TAKEN IN ACCORDANCE WITH THE UNIFORM PRINCIPLES.....	15
3.1.1	<i>Physical and chemical properties</i>	<i>15</i>
3.1.2	<i>Methods of analysis</i>	<i>15</i>
3.1.3	<i>Mammalian Toxicology.....</i>	<i>15</i>
3.1.4	<i>Residues and Consumer Exposure</i>	<i>15</i>
3.1.5	<i>Environmental fate and behaviour.....</i>	<i>15</i>
3.1.6	<i>Ecotoxicology.....</i>	<i>15</i>
3.1.7	<i>Efficacy</i>	<i>16</i>
3.2	CONCLUSIONS ARISING FROM FRENCH ASSESSMENT	16
3.3	FURTHER INFORMATION TO PERMIT A DECISION TO BE MADE OR TO SUPPORT A REVIEW OF THE CONDITIONS AND RESTRICTIONS ASSOCIATED WITH THE AUTHORISATION	16
	APPENDIX 1 – COPY OF THE FRENCH DECISION	17
4	APPENDIX 2 – COPY OF THE DRAFT PRODUCT LABEL AS PROPOSED BY THE APPLICANT	54
	APPENDIX 3 – LETTER(S) OF ACCESS	67

PART A – Risk Management

The company CERTIS Europe B.V. has requested a label extension in France for the ERADICOAT MAX (formulation code: CE-10239-I) according to article 51 Regulation (EC) no 1107/2009¹

This document describes the specific conditions of use and labelling required for extension of the registration of ERADICOAT MAX (CE-10239-I) containing maltodextrin in France.

The conclusions of the risk assessment are based on the already existing registration of the preparation in France. Therefore, the evaluation of the current application is limited to the points not covered by the existing registration.

Appendix 1 of this document provides a copy of the French Decision.

Appendix 2 of this document is a copy of the draft product label as proposed by the applicant.

Appendix 3 of this document is a copy of the letter(s) of access.

1 DETAILS OF THE APPLICATION

1.1 Application background

ERADICOAT MAX is a soluble concentrate product containing 476 g/L maltodextrin, for use as an insecticide for the control of various pests. The aim of this registration application is to gain a label extension for crops of banana, mango, pineapple, papaya, avocado, sweet almond, walnut, pistachio, hazelnut, seed production crops, roses, floral and bedding plants, ornamental trees, tree nursery and perennials, blackcurrant, raspberry, cherry, fig, kaki, kiwäi, pomegranate, soursop, passion fruit, lychee, artichoke and cardoon, asparagus, beetroot, celery, chicory roots, lettuce, spinach, fresh beans, fresh peas, sweet maize, turnip, onion, salsify, tobacco, hop and palm tree.

The complete GAP for the national application in France is provided below, under point 2.3.

1.2 Active substance approval

Maltodextrin

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 355/2013 of 18 April 2013 approving the active substance maltodextrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/201.

Specific provisions of Regulation (EU) No 355/2013 were as follows :

PART B

In this overall assessment Member States shall pay particular attention to:

- (a) the potential increased growth of fungi and possible presence of mycotoxins on the surface of treated fruits;
- (b) the potential risk to honeybees and non-target arthropods.

Conditions of use shall include risk mitigation measures, where appropriate.

An EFSA conclusion is available (EFSA Journal 2013;11(1):3007).

A Review Report is available (SANCO/10384/2013 rev 1, 15 March 2013).

¹ REGULATION (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

1.3 Regulatory approach

The present application (n°2021-1048) was evaluated in France by the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses).

The current document based on Anses' assessment of the application submitted for this product is in compliance with Regulation (EC) no 1107/2009, implementing regulations and French regulations.

Since the application is intended for use in France only, the draft Part A was not circulated for comments.

According to the French law and procedures, specific conditions of use are set out in the Decision letter.

The French Order of 4th May 2017² provides that:

- unless formally stated in the product authorisation, the pre harvest interval (PHI) is at least 3 days;
- unless formally stated in the product authorisation, the minimum buffer zone alongside a water body is 5 m;
- unless formally stated in the product authorisation, the minimum re-entry period is 6 hours for field uses and 8 hours for indoor uses.

Drift reduction measures such as low-drift nozzles are not considered within the decision making process in France. However, drift buffer zones may be reduced under some circumstances as explained in appendix 3 of the above-mentioned French order.

The data taken into account are those deemed to be valid either at European Union level or at zonal/national level. This part A presents a summary of essential scientific points upon which recommendations are based and is not intended to show the assessment in detail.

The conclusions relating to the acceptability of risk are based on the criteria indicated in Regulation (EU) N°546/2011³, and are expressed as “acceptable” or “not acceptable”/“not finalised” in accordance with those criteria.

Finally, the French Order of 12 April 2021⁴ provides that:

- an authorisation granted for a « reference » crop applies also for “linked” crops unless formally stated in the decision
- the “reference” and “linked crops are defined in appendix 1 of that French order. .

Thus, at French national level, possible extrapolation of submitted data and the corresponding assessment from “reference” crops to “linked” ones are undertaken even if not clearly requested by the applicant in their dRR, and a conclusion is reached on the acceptability of the intended uses on those “linked” crops. The aim of this Order, mainly based on the EU document on residue data extrapolation⁵ is to supply “minor” crops with registered plant protection products.

Therefore the GAP table (Section 2.3) and Decision may include uses on crops not originally requested by the applicant. The Decision, as reproduced in Appendix 1, takes also into account national provisions, including national mitigation measures.

1.4 Data protection claims

There is no new data submitted with this application.

Data protection is claimed in accordance with Article 59 of Regulation (EC) No. 1107/2009 as provided for in the list of references in Appendix 4.

² Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2019.

³ COMMISSION REGULATION (EU) No 546/2011 of 10 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products

⁴ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401456>

⁵ SANCO document “guidance document:- Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs”: SANCO/ 7525/VI/95 - rev.9

1.5 Letter(s) of access

Not relevant for this application.

2 DETAILS OF THE AUTHORISATION

2.1 Product identity

Product name (code)	ERADICOAT MAX
Authorisation number	2190191
Function	Insecticide
Applicant	CERTIS Europe B.V.
Composition	Maltodextrin 476 g/L
Formulation type (code)	Soluble concentrate [Code: SL]
Packaging	Not relevant for extension of authorisation according article 51.

2.2 Classification and labelling

2.2.1 Classification and labelling under Directive 99/45/EC

Not relevant for extension of authorisation according article 51.

2.2.2 Classification and labelling in accordance with Regulation (EC) No1272/2008

Not relevant for extension of authorisation according article 51.

2.2.3 Other phrases in compliance with Regulation (EU) No 547/2011

Refer to the decision of product authorization.

2.2.4 Other phrases linked to the preparation

Wear suitable personal protective equipment ⁶ : refer to the Decision in Appendix 1 of product authorisation.
Re-entry period ⁷ : 48h
Pre-harvest interval ⁸ : refer to the decision of product authorisation.
Other mitigation measures: refer to the decision of product authorisation. The following measure is added:
- Spe ⁸ : To protect bees and other pollinators, do not use in the presence of bees and other pollinators, do not apply during flowering season, do not apply when flowering weeds are present.
The label must reflect the conditions of authorisation.

⁶ If a tractor with cab is used, wearing gloves during application is only required when working with the spray mixture

⁷ The legal basis for this is **Titre I Article 3** of the French Order of 4th May 2017 concerning the marketing and use of products encompassed by article L. 253-1 of the rural code [that is, plant protection products/pesticides]

⁸ According to the French Order of 4th May 2017, PHI cannot be lower than 3 days unless specifically stated in the assessment and decision.

2.3 Product uses

Please note: The GAP Table below reports the intended uses proposed by the applicant, and possible extrapolation according to French Order of 26 March 2014 (highlighted in green), evaluated and concluded as safe uses by France as zRMS. Those uses are then granted in France.

When the conclusion is “not acceptable”, the intended use is highlighted in grey and the main reason(s) reported in the remarks.

When a use is “acceptable” with GAP restrictions, the modifications of the GAP are in bold.

Use should be crossed out when the applicant no longer supports this use.

GAP rev. 1, date: 2021-12-30

PPP (product name/code): ERADICOAT MAX (CE-10239-I)

Formulation type: SL ^(a, b)

Active substance 1: maltodextrin

Conc. of a.s. 1: 476 g/L ^(c)

Safener: -

Conc. of safener: - ^(c)

Synergist: -

Conc. of synergist: - ^(c)

Applicant: CERTIS Europe B.V.

Professional use: ☒

Zone(s): Southern Zone ^(d)

Non-professional use: ☐

Verified by MS: Yes

Field of use: Insecticide

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or situation (crop destination/purpos e of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
Minor uses according to Article 51 (zonal and interzonal uses)													
10	FRANCE	Banana (MUBSS)	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
11	FRANCE	Mango (MNGIN)	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist g per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
12	FRANCE	Pineapple (ANCHO)	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
13	FRANCE	Papaya CIAPA)	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
14	FRANCE	Papaya CIAPA)	G	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
15	FRANCE	Avocado (PEBAM)	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
19	FRANCE	Seed production crops	F	Various pests (aphids, mites, whiteflies, scales, psylla...)	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
20	FRANCE	“PPAMC” / All Aromatic, Medicinal Perfume and Condiment plants (edible and non edible crops)	F	Various pests (aphids, mites, whiteflies, scales, psylla...)	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
21	FRANCE	Roses	F	Aphids, Mites, Whiteflies	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist g per ha (f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
22	FRANCE	Floral and bedding plants	F	Aphids, Mites, Whiteflies	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
23	FRANCE	Ornamental trees, tree nursery and perennials	F	Aphids, Mites, Whiteflies, Psylla	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
24	FRANCE	Roses	F	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
25	FRANCE	Roses	G	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
26	FRANCE	Floral and bedding plants	F	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
27	FRANCE	Floral and bedding plants	G	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist g per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
28	FRANCE	Ornamental trees, tree nursery and perennials	F	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
29	FRANCE	Ornamental trees, tree nursery and perennials	G	Scales	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	N/A	Acceptable
30	FRANCE	Blackcurrant and its related crops Raspberry and its related crops	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
31	FRANCE	Blackcurrant and its related crops Raspberry and its related crops	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
32	FRANCE	Blackcurrant and its related crops Raspberry and its related crops	G	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
33	FRANCE	Cherry, Fig, Kaki, Kiwaï, Pomegranate	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist g per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
34	FRANCE	Soursop and its related crops	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
35	FRANCE	Passion fruit and its related crops	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
36	FRANCE	Passion fruit and its related crops	G	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
37	FRANCE	Papaya tree	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
38	FRANCE	Papaya tree	G	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
39	FRANCE	Lychee and its related crops	F	Scales	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
40	FRANCE	Blackcurrant and its related crops Raspberry and its related crops	F	Psylla	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 30 L (2 L/hL) b) 150	a) 14.28 b) 71.4	1000- 1500	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
41	FRANCE	Fig, Tree nuts, Kiwi, Kiwaï, Olive, Peach and its related crops	F	Psylla	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 30 L (2 L/hL) b) 150	a) 14.28 b) 71.4	1000- 1500	1	Acceptable
42	FRANCE	Artichoke and Cardoon	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
43	FRANCE	Asparagus	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
44	FRANCE	Beetroot	F	Aphids, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
45	FRANCE	Carrot and its related crops	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
46	FRANCE	Celery (stem vegetables) and its related crops	F	Aphids, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
47	FRANCE	Chicory roots	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
48	FRANCE	Leafy brassicas, Kohlrabi	F	Aphids, Whiteflies, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
49	FRANCE	Lettuce and its related crops	F	Whiteflies	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
50	FRANCE	Spinach and its related crops	F	Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
51	FRANCE	Gardencress	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
52	FRANCE	Fresh beans without pods	F	Aphids, Whiteflies, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
53	FRANCE	Fresh peas without pods	F	Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
54	FRANCE	Sweet maize	F	Aphids, Whiteflies, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
55	FRANCE	Turnip and its related crops	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
56	FRANCE	Onion and its related crops	F	Aphids, Whiteflies, Mites	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
57	FRANCE	Salsify and its related crop	F	Aphids	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	1	Acceptable
58	FRANCE	Tobacco	F	Aphids, Whiteflies	Foliar spray	BBCH 00-89	a)1 b) 5	3	a) 30 L b) 150	a) 14.28 b) 71.4	200- 1500	NA	Acceptable
59	FRANCE	Hop	F	Aphids, Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. safener/synergist g per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
60	FRANCE	Blackcurrant and its related crops Raspberry and its related crops	F	Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
61	FRANCE	Raspberry and its related crops	F	Whiteflies	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
62	FRANCE	Cherry, Tree nuts, Pomegranate, Kaki, Kiwaï	F	Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
63	FRANCE	Pineapple, Avocado, Guava, Mango	F	Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
64	FRANCE	Passion fruit and its related crops, Papaya tree	F	Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
65	FRANCE	Passion fruit and its related crops, Papaya tree	G	Mites	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable
66	FRANCE	Citrus, Pomegranate, Kaki, Kiwaï	F	Whiteflies	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use- No. ^(e)	Member state(s)	Crop or and/ situation (crop destination/purpose of crop)	F, Fn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f) RMS CONCLUSION
					Method/K ind	Timing/Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/ season	Min. interval between applications (days)	L product/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	kg a.s./ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min/max		
67	FRANCE	Avocado, Banana, Guava, Mango, Palm tree	F	Whiteflies	Foliar spray	BBCH 69-89	a)1 b) 5	5	a) 45 L (1.5 L/hL) b) 225	a) 21.42 b) 107.1	1000 - 3000	1	Acceptable

Remarks table heading:

(a) e.g. wettable powder (WP), emulsifiable concentrate (EC), granule (GR)
(b) Catalogue of pesticide formulation types and international coding system CropLife International Technical Monograph n°2, 6th Edition Revised May 2008
(c) g/kg or g/l

Remarks columns:

1 Numeration necessary to allow references
2 Use official codes/nomenclatures of EU Member States
3 For crops, the EU and Codex classifications (both) should be used; when relevant, the use situation should be described (e.g. fumigation of a structure)
4 F: professional field use, Fn: non-professional field use, Fpn: professional and non-professional field use, G: professional greenhouse use, Gn: non-professional greenhouse use, Gpn: professional and non-professional greenhouse use, I: indoor application
5 Scientific names and EPPO-Codes of target pests/diseases/ weeds or, when relevant, the common names of the pest groups (e.g. biting and sucking insects, soil born insects, foliar fungi, weeds) and the developmental stages of the pests and pest groups at the moment of application must be named.
6 Method, e.g. high volume spraying, low volume spraying, spreading, dusting, drench Kind, e.g. overall, broadcast, aerial spraying, row, individual plant, between the plants - type of equipment used must be indicated.

(d) Select relevant
(e) Use number(s) in accordance with the list of all intended GAPs in Part B, Section 0 should be given in column 1
(f) No authorisation possible for uses where the line is highlighted in grey, Use should be crossed out when the notifier no longer supports this use.

7 Growth stage at first and last treatment (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), including where relevant, information on season at time of application
8 The maximum number of application possible under practical conditions of use must be provided.
9 Minimum interval (in days) between applications of the same product
10 For specific uses other specifications might be possible, e.g.: g/m³ in case of fumigation of empty rooms. See also EPPO-Guideline PP 1/239 Dose expression for plant protection products.
11 The dimension (g, kg) must be clearly specified. (Maximum) dose of a.s. per treatment (usually g, kg or L product/ha).
12 If water volume range depends on application equipments (e.g. ULVA or LVA) it should be mentioned under "application: method/kind".
13 PHI - minimum pre-harvest interval
14 Remarks may include: Extent of use/economic importance/restrictions

3 RISK MANAGEMENT

3.1 Reasoned statement of the overall conclusions taken in accordance with the Uniform Principles

3.1.1 Physical and chemical properties

Not relevant for extension of authorisation according article 51.

3.1.2 Methods of analysis

3.1.2.1 Analytical method for the formulation

Not relevant for extension of authorisation according article 51.

3.1.2.2 Analytical methods for residues

Further data for this application are not necessary.

3.1.3 Mammalian Toxicology

Based on European evaluation of the active substance, the determination of reference values has been considered not necessary. Therefore, and based on available data, no risk for human health are expected for operator, bystander, resident and workers if the product is used as intended.

For details of personal protective equipment for operators and workers, refer to the Decision in Appendix 1 of product authorisation.

3.1.4 Residues and Consumer Exposure

The active substance maltodextrin is included to annex IV of regulation (EC) n°396/2005, listing substances for which no MRL are required.

However, the implementing regulation approving maltodextrin as an active substance asks member states to pay particular attention to “the potential increased growth of fungi and possible presence of mycotoxins on the surface of treated fruits” that may occur following the use of products containing maltodextrin.

Post authorisation data have already been requested by France in the framework of the application for authorisation of the product ERADICOAT MAX (n°AMM 2190191) and are still required.

This post-authorisation data requirement is under evaluation by Ireland (as zRMS) and will be provided at the time of product renewal.

3.1.5 Environmental fate and behaviour

According to previous risk assessments performed by Anses, no unacceptable risk for groundwater is expected. Similar mitigation measures as defined for previous risk assessment apply.

3.1.6 Ecotoxicology

According to previous risk assessments performed by Anses, no unacceptable risk for terrestrial and aquatic non-target organisms is expected, except for bees. **The new study on tunnel provided to meet the requirements of Regulation (EU) No. 284/2013 does not allow to finalise the risk for these organisms, the dose tested in the study being lower than the dose requested for all uses. The risk for bees is considered as not finalised for intended uses in field and under tunnels.**

Mitigation measures is undertaken.

3.1.7 Efficacy

According to Article 51 of Regulation (EC) No 1107/2009, the efficacy assessment and the absence of any phytotoxicity risk on the crop is not necessary.

3.2 Conclusions arising from French assessment

Taking into account the above assessment, an authorisation can be granted as proposed in Appendix 1 – Copy of the product Decision.

3.3 Further information to permit a decision to be made or to support a review of the conditions and restrictions associated with the authorisation

No further information is required.

Appendix 1 – Copy of the French Decision

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Décision relative à une demande d'extension d'usages d'un produit phytopharmaceutique et aux demandes associées

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu les demandes d'extension d'usages majeurs, d'extension d'usages mineurs et d'attribution de la mention « abeille » du produit phytopharmaceutique **ERADICOAT MAX***

de la société CERTIS EUROPE BV

enregistrées sous les n°2021-1036, 2021-1048, 2021-1683 et 2021-1301

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 25 novembre 2021,

L'autorisation de mise sur le marché du produit référencé ci-après **est étendue** aux usages décrits dans la présente décision.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Informations générales sur le produit	
Noms du produit	ERADICOAT MAX MAJESTIK
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	CERTIS EUROPE BV 5 rue Galilée 78280 GUYANCOURT France
Formulation	Concentré soluble (SL)
Contenant	476 g/L - maltodextrine
Numéro d'intrant	1038-2017.01
Numéro d'AMM	2190191
Fonction	Acaricide et insecticide
Gamme d'usage	Professionnel

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 30/12/2021

DocuSigned by:
Charlotte Grastilleur
AE281A955AA2454...

Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit

Classification du produit	
La classification retenue est la suivante :	
Catégorie de danger	Mention de danger
Sensibilisants cutanés - Catégorie 1 sous-catégorie A	H317 : Peut provoquer une allergie cutanée
Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 1	H318 : Provoque des lésions oculaires graves
Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.	
Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.	

DocuSign Envelope ID: 35A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85696BD784



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12053103 Agrumes*Trt Part.Aer.* Acariens et phytotoxes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12053107 Agrumes*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12053101 Agrumes*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
13053103 Ananas*Trt Part.Aer.* Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

ERADICOAT MAX
AMM n°2190191

Page 4 sur 35

DocuSign Envelope ID: 35A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698BD784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
13053101 Ananas*Tit Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
14053107 Arbres et arbustes* Tit Part.Aer.*Acariens	30 L/ha	5/an	Jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
01002019 Arbres et arbustes* Tit Part.Aer.*Aleurodes	30 L/ha	5/an	Jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
14053101 Arbres et arbustes* Tit Part.Aer.*Cochenilles	30 L/ha	5/an	Jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

ERADICOAT MAX
AMM n°2190191

Page 5 sur 36

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
00502031 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.*Psylle(s)	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
14053105 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.*Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16103101 Artichaut*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16153103 Asperge*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
00803004 Avocatier*Trt Part.Aer.* Acaréens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00803006 Avocatier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00801021 Avocatier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00804013 Bananier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698BD784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
13153101 Bananier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
01106010 Betterave potagère* Trt Part.Aer.*Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16173102 Betterave potagère* Trt Part.Aer.*Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16203102 Carotte*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.								
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traîtee aquatique (mètres)	Zone Non Traîtee arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traîtee plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12153101 Cassissier*Trt Part.Aer.* Acariens et phytoptes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
12153107 Cassissier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
12153102 Cassissier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
12153103 Cassissier*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB56968D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16253106 Céleri-branch*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
19273101 Céleri-branch*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
12203113 Cerisier*Trt Part.Aer.* Acariens et phytoptes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12203114 Cerisier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16353102 Chicorées - Production de racines* Trt Part.Aer.*Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
00516043 Choux feuillus*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
00516044 Choux feuillus*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
00516053 Choux feuillus*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
00516083 Choux-raves*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
00516082 Choux-raves*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
00516073 Choux-raves*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
00806007 Corossol*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16463103 Cresson alenois*rt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16323103 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16753101 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16753102 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16753103 Cucurbitacées à peau non comestible* Tri Part.Aer.*Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17403101 Cultures florales et plantes vertes*Tri Part.Aer.* Acariens, phytophages et ténarionèmes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17403102 Cultures florales et plantes vertes*Tri Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17403103 Cultures florales et plantes vertes*Tri Part.Aer.* Cochenilles	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17403104 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16503104 Epinard*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16503102 Epinard*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 00 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
12303106 Figuier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12303101 Figuier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
16553104 Fraisier*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
12353102 Framboisier*Trt Part.Aer.* Acariens et phytophages	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
12353117 Framboisier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitee aquatique (mètres)	Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12353116 Framboisier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12353105 Framboisier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12353103 Framboisier*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
00807005 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Egalement autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

ERADICOAT MAX
AMM n°2190191

Page 17 sur 36

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
00807013 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
	Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
12453115 Fruits à coque*Trt Part.Aer.* Acariens et phytomydes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
12453114 Fruits à coque*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
12453107 Fruits à coque*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12603166 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
Uniquement sur poirier Efficacité montrée sur psylles 5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
13453101 Goyavier*Trt Part.Aer.* Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00808004 Goyavier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12803105 Grenadier*Trt Part.Aer.* Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12803106 Grenadier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12803107 Grenadier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
16573101 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16573102 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16573107 Haricots et Pois écossés frais*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
15353102 Houblon*Trt Part.Aer.* Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
15353104 Houblon*Trt Part.Aer.* Pucerons	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12753104 Kaki*Trt Part.Aer.* Acariens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698B0784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12753105 Kaki*Tri Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12753101 Kaki*Tri Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12023106 Kiwai*Tri Part.Aer.* Acarie	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12023107 Kiwai*Tri Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12023102 Kiwai*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12023103 Kiwai*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
12013101 Kiwi*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
16603104 Laitue*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16603101 Laitue*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
13503101 Litchi*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
16663101 Maïs doux*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16663109 Maïs doux*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16663106 Maïs doux*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
13813102 Manguier*Trt Part.Aer.* Acaréens	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00810012 Manguier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
00810013 Manguier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16773105 Navet*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
01102011 Oignon*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16803106 Oignon*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16053104 Oignon*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698BD784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.								
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12503104 Olivier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
00811010 Palmiers alimentaires* Trt Part.Aer.*Aleurodes	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
01271001 Papayer*Trt Part.Aer.* Acaris	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
01271002 Papayer*Trt Part.Aer.* Cochenilles	45 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12573131 Pêcher - Abricotier* Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles	30 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								
16863101 Poivron*Trt Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
16863103 Poivron*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
10993100 Porte graine*Trt Part.Aer.* Ravageurs divers	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009 Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698D784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
19993100 PPAMC*Tri Part.Aer.* Ravageurs divers	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17303101 Rosier*Tri Part.Aer.* Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17303117 Rosier*Tri Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								
17303118 Rosier*Tri Part.Aer.* Cochenilles	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
Egalement autorisé sous abri. 5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.								

DocuSign Envelope ID: 38A0076E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17303108 Rosier*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
01066001 Salsifis*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	3	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
15853105 Tabac*Trt Part.Aer.* Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
15853101 Tabac*Trt Part.Aer.* Pucerons	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	Non applicable	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C85698B0784



Liste des usages autorisés En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitee aquatique (mètres)	Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
16953109 Tomate - Aubergine* Trit Part.Aer.*Acariens	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
16953101 Tomate - Aubergine* Trit Part.Aer.*Aleurodes	30 L/ha	5/an	jusqu'au stade BBCH 89	1	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.							
12703101 Vigne*Trit Part.Aer.* Acariens	22,5 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 01 et BBCH 53	F (BBCH 53)	5	5	-	-
	5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							
12703136 Vigne*Trit Part.Aer.* Cochenilles	22,5 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 69 et BBCH 89	3	5	5	-	-
	Uniquement sur raisin de table, vignes-mères et pépinières viticoles. 5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.							

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5C856988D784



Liste des usages autorisés								
En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ. En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.								
Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traînée aquatique (mètres)	Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12703115 Vigne*Trt Part.Aer.* Erinose	22,5 L/ha	5/an	entre les stades BBCH 01 et BBCH 53	F (BBCH 53)	5	5	-	-
5 applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.								

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.

Liste des usages refusés			
Usages	Dose d'emploi	Nombre maximum d'applications	Délai avant récolte (jours)
12613116 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.* Psylle(s)	30 L/ha	5/an	1
Motivation du refus : L'usage est refusé car transitoire et transformé en l'usage 12603166 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles			

L'étude conduite sous tunnel et fournie afin de répondre aux éléments requis par le règlement (UE) n° 284/2013 ayant été conduite à une dose inférieure à celles revendiquées, il n'est pas possible d'exclure un risque inacceptable pour les insectes pollinisateurs et donc d'accorder une dérogation pour un emploi durant la floraison ou en période de production d'exsudats.

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles.
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

Les équipements de protection individuelle ci-après sont applicables à tous les usages du produit utilisant ce mode d'application.

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance

• pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3) ;

• pendant l'application : sans contact intense avec la végétation

Culture basse (< 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

Culture haute (> 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

• pendant l'application : contact intense avec la végétation

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



OU

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe

• **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

• **pendant l'application**

Si application avec tracteur avec cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à dos

• **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3) ;

• **pendant l'application**

- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;

• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection non tissée de catégorie III type 4

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique ou d'un atomiseur

• **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3) ;

• **pendant l'application**

Si application avec tracteur avec cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Lunettes ou écran facial certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

Pour le travailleur, porter

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A).

Les équipements de protection individuelle ci-dessus sont applicables à tous les usages du produit.

Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :

- 48 heures.

Respect des limites maximales de résidus (LMR)

- Le délai avant récolte est fixé en fonction des pratiques agricoles sur la culture et afin de limiter l'exposition potentielle des consommateurs.

DocuSign Envelope ID: 38A0D76E-3CC7-4782-B8FC-5CB5698BD784



Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

Protection de l'eau

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Protection de la faune

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

- SPe 3 : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Au regard des usages autorisés, la mesure de gestion suivante s'applique à l'ensemble des usages du produit »

- Spe8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

Pour les usages sous abri fermé, peut porter atteinte aux insectes pollinisateurs et à la faune auxiliaire. Éviter toute exposition inutile.

Recommandations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Contient de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one et de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

- Pour les usages mineurs dont l'autorisation a été accordée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.

Au regard des données à sa disposition, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché décline toute responsabilité sur ces éventuels risques.

Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.

Les autres modalités d'autorisation du produit restent inchangées.

4 Appendix 2 – Copy of the draft product label as proposed by the applicant

ERADICOAT MAX – Projet d'étiquette pour la demande d'extension d'usages (usages majeurs/mineurs liés au dossier zonal et usages mineurs selon Article 51 France) – Février 2021

ERADICOAT® MAX		CERTIS
Cultures légumières et ornementales		INSECTICIDE de biocontrôle
ERADICOAT® MAX - A.M.M. 2190191 (contient une solution aqueuse d'alkyl polyglucosides à base d'alcool gras naturel C8-C10, de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one)		
DANGER		
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.	
H318	Provoque de graves lésions des yeux.	
Conseils de prudence		
P261	Eviter de respirer les brouillards de pulvérisation et aérosols.	
P280	Porter des gants, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.	
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.	
P305+P351+P338+P310	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.	
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.	
P501	Eliminer le contenu et l'emballage via une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux.	
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	
SP1	Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.].	
Délai de rentrée : 48 heures.		
Ce produit peut porter atteinte aux pollinisateurs et à la faune auxiliaire. Éviter toute exposition inutile.		
ERADICOAT® MAX – A.M.M. n° 2190191 – CERTIS Europe B.V. Maltodextrine : 476 g/L (40% p/p) Concentré soluble (SL)		
© Marque déposée CERTIS Europe B.V.		v.02/2021
EN CAS D'URGENCE Composer le 15 ou le 112 ou contacter le centre anti poison le plus proche.	Puis signaler vos symptômes au réseau Phyt'Attitude (numéro 0 800 887 887 – appel gratuit depuis un poste fixe). En cas d'incident ou d'accident, appeler le 01.72.11.00.03 (Carechem, numéro d'urgence 24h/24h). Fiche de données de sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur demande à CERTIS au 01.34.91.90.00. ou en scannant le QR code avec votre téléphone mobile.	
RÉSERVÉ A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL - RÉEMPLOI DE L'EMBALLAGE INTERDIT Lire attentivement cette étiquette avant toute utilisation.		
Distribué par : CERTIS Europe B.V. - France 5, rue Galilée 78280 GUYANCOURT - Tél : 01.34.91.90.00 - Fax : 01.30.43.76.55 N° Agrément : IF01808 - Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.		
Fabriqué et conditionné en Europe pour le compte de CERTIS Europe B.V. N° de lot et la date de fabrication : voir indication sur l'emballage.		

x L

PREMIERS SECOURS

S'éloigner de la zone dangereuse.

- **En cas de contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau, en maintenant la paupière bien ouverte, pendant au moins 15 minutes. Retirer les éventuelles lentilles de contact et continuer de rincer. Consulter un médecin immédiatement.
- **En cas de contact avec la peau** : Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Laver la peau abondamment à l'eau savonneuse. Consulter un médecin en cas d'irritation. Laver les vêtements contaminés avant une nouvelle utilisation.
- **En cas d'inhalation** : En cas de difficultés respiratoires, amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin en cas de malaise ou si les troubles persistent.
- **En cas d'ingestion** : Rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin en cas de troubles ou de malaise.

Dans tous les cas, en cas de malaise ou si des symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter l'étiquette et/ou la fiche de données de sécurité.

- **En cas d'intoxication animale** : contacter votre vétérinaire.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

ERADICOAT® MAX est un insecticide de contact, à base de maltodextrine, qui permet de lutter contre les acariens et aleurodes sur cultures légumières et ornementales sous abri (serre fermée), contre les acariens et cochenilles en vigne et en arboriculture, contre les acariens, aleurodes et pucerons sur cultures légumières de plein champ. Il est particulièrement adapté à la gestion des foyers. L'utilisation d'ERADICOAT® MAX bloque les orifices respiratoires de l'insecte entraînant son asphyxie. L'effet observé 2 à 4 heures après l'application est amélioré par des applications répétées.

ERADICOAT® MAX est un produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement (UE) n°2018/848.

Usages autorisés

ERADICOAT® MAX est homologué pour le traitement des parties aériennes.

Cultures	Cibles	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Délai Avant Récolte
USAGES SOUS SERRE FERMEE				
Cultures légumières <i>Sous abri en serre fermée</i>	Aleurodes, Acariens	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	1 jour

Cassissier (cassissier , myrtille , groseillier , sureau noir , airelle , cynorhodon , azerolier) Sous abri en serre fermée	Acariens et phytophages	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	1 jour
Framboisier (framboisier , mûres , mûres des haies) Sous abri en serre fermée	Acariens et phytophages, Aleurodes	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	1 jour
Cultures florales et plantes vertes Sous abri en serre fermée	Aleurodes, Acariens	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	non applicable
Rosier Sous abri en serre fermée				
Arbres et arbustes Sous abri en serre fermée				
Cultures porte graine Sous abri en serre fermée	Ravageurs divers (acariens, aleurodes)	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	non applicable
PPAMC ¹ Sous abri en serre fermée	Ravageurs divers (acariens, aleurodes)	60 L/ha * (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	20 / an	1 jour
USAGES PLEIN CHAMP				
Agrumes (oranger , citronnier , pamplemoussier , mandarinier , clémentinier , limettier , kumquat)	Acariens, Cochenilles	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Pommier (UNIQUEMENT sur poirier)	Psylle	30 L/ha (usage recommandé à 2 L/hl)	5 / an	1 jour
Vigne	Acariens, Erinose	22,5 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Vigne (UNIQUEMENT	Cochenilles	22,5 L/ha (usage recommandé à 1,5	5 / an	1 jour

<i>raisin de table)</i>		L/ha)		
Epinard <i>(épinard, feuilles de bette, pourpier)</i>	Pucerons, Acariens	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Laitue <i>(laitues, chicorées-scaroles, chicorées-frisées, mâche, roquette et autres salades)</i>	Pucerons, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Fraisier	Acariens	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Tomate <i>(tomate, aubergine)</i>	Acariens, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Poivron <i>(poivron, piment)</i>	Acariens, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Concombre <i>(concombre, courgette, cornichon, autres cucurbitacées à peau comestible)</i>	Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Melon <i>(melon, pastèque, potiron, autres cucurbitacées à peau comestible)</i>	Acariens, Aleurodes, Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
<u>Extensions d'usages obtenues dans le cadre de l'Article 51 du Règlement (CE) n°1107/2009</u> Pour les usages mentionnés ci-dessous, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité. Au regard des données à sa disposition, CERTIS décline toute responsabilité sur ces éventuels risques. Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur ces cultures. Il est également recommandé de contacter les organisations professionnelles concernées, afin de connaître les précautions et recommandations d'emploi liées à l'utilisation de ERADICOAT® MAX pour ces usages.				
Ananas <i>Plein champ</i>	Cochenilles, Acariens	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/ha)	5 / an	1 jour
Avocatier <i>Plein champ</i>	Cochenilles, Acariens, Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/ha)	5 / an	1 jour
Banancier <i>Plein champ</i>	Cochenilles, Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/ha)	5 / an	1 jour

Manguier <i>Plein champ</i>	Cochenilles, Acariens, Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Papayer <i>Plein champ</i>	Cochenilles	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Fruits à coque (amandier châtaignier, noisetier, noyer, pistachier) <i>Plein champ</i>	Cochenilles	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Palmiers alimentaires <i>Plein champ</i>	Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour
Cassissier et ses cultures rattachées ; Framboisier et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Pucerons, Psylle	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Cassissier et ses cultures rattachées ; Framboisier et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Acariens	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Framboisier et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Cassissier et ses cultures rattachées ; Framboisier et ses cultures rattachées <i>Plein champ – Sous abri</i>	Cochenilles	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Cerisier, Figuier, Kaki, Kiwai, Grenadier, Corossol et ses cultures rattachées, Litchi et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Cochenilles	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Fruit de la passion et ses cultures rattachées, Papayer <i>Plein champ – Sous abri</i>	Cochenilles, Acariens	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour

Figuier, Fruits à coque, Kiwi, Kiwaï, Olivier, Pêcher et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Psylle	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Cerisier, Fruits à coque, Grenadier, Kaki, Kiwaï <i>Plein champ</i>	Acariens	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Goyavier <i>Plein champ</i>	Acariens, Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
Agrumes, Grenadier, Kaki, Kiwaï <i>Plein champ</i>	Aleurodes	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl ou 15 ml/L d'eau)	5 / an	1 jour
PPAMC ¹ <i>Plein champ</i>	Ravageurs divers (acariens, aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles)	30 L/ha ** (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Cultures porte graine <i>Plein champ</i>	Ravageurs divers (acariens, aleurodes, pucerons, cochenilles, psylles)	30 L/ha ** (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	non applicable
Arbres et arbustes <i>Plein champ</i>	Pucerons, Acariens, Aleurodes, Psylles	30 L/ha ** (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 / an	non applicable
Cultures florales et plantes vertes, Rosier <i>Plein champ</i>	Pucerons, Acariens, Aleurodes	30 L/ha ** (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 / an	non applicable
Arbres et arbustes, Cultures florales et plantes vertes, Rosier <i>Plein champ – Sous abri</i>	Cochenilles	30 L/ha ** (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 / an	non applicable
Artichaut (artichaut , cardon) <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Asperge <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Betterave potagère <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Carotte et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour

Céleri-branché et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Chicorées production de racines <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Choux feuillus, Choux-raves <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Cresson alénois <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Haricots écosés frais <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Pois écosés frais <i>Plein champ</i>	Acariens	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Maïs doux <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Navet et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Oignon et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons, Aleurodes	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Salsifis et ses cultures rattachées <i>Plein champ</i>	Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	1 jour
Tabac <i>Plein champ</i>	Aleurodes, Pucerons	30 L/ha (usage recommandé en localisé à 20ml/L d'eau)	5 par cycle de culture	non applicable
Houblon <i>Plein champ</i>	Acariens, Pucerons	45 L/ha (usage recommandé à 1,5 L/hl)	5 / an	1 jour

¹ : PPAMC = Plantes à parfum, Aromatiques, Médicinales et Condimentaires

* Les doses indiquées dans le tableau sont les doses maximales homologuées, cependant pour l'utilisation du produit, il est recommandé de ne pas dépasser 15 à 20 ml de produit par litre d'eau en fonction des cultures.

Le volume d'eau appliqué doit prendre en compte le volume de végétation des zones à traiter en localisé en pulvérisant à la limite du ruissellement afin d'assurer le contact entre ERADICOAT® MAX et ses cibles. Il n'est pas recommandé de dépasser 1000 L d'eau /ha.

Les Limites Maximales de Résidus, définies au niveau de l'Union Européenne, sont consultables à l'adresse suivante : <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database>. Aucune L.M.R. n'est requise pour la maltodextrine (Annexe IV Règlement (CE) n°396/2005.)

CERTIS ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et dans les recommandations d'emploi et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages en vigueur. Ainsi, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Conditions d'application

L'emploi d'ERADICOAT® MAX est recommandé dans le cadre de la gestion des foyers d'insectes ravageurs sous serre fermée (traitement localisé sur une zone ou une portion de parcelle) en ciblant les parties végétatives des plantes (parties hautes). Inclure ERADICOAT® MAX dans le cadre d'un programme de lutte intégrant une diversité de solutions.

Pour obtenir des résultats optimaux, ERADICOAT® MAX s'utilise dès l'apparition des premiers ravageurs et peut être utilisé tout au long du cycle cultural. Répéter fréquemment l'application à intervalle régulier (3 à 7 jours entre les applications) afin d'interrompre le cycle de développement de l'insecte (4 applications peuvent être nécessaire).

Compte tenu du mode d'action d'ERADICOAT® MAX, une attention particulière doit être portée à la qualité de pulvérisation. Veiller à assurer une couverture optimale des zones à traiter. Traiter en conditions sèches et ensoleillée. L'efficacité d'ERADICOAT® MAX est optimale quand le séchage de la bouillie est atteint en 1 heure.

ERADICOAT® MAX se caractérise par son action de choc et n'a pas d'action résiduelle. Son utilisation est compatible avec les stratégies de Production Biologique Intégrée. La réintroduction des auxiliaires peut se faire dès séchage de la bouillie sur le feuillage.

Précautions d'emploi

En raison de la diversité des espèces et variétés en cultures ornementales et cultures porte-graine qui peuvent être traitées, nous recommandons d'effectuer un test de sélectivité de la spécialité ERADICOAT® MAX sur quelques plantes avant d'étendre le traitement à la parcelle entière.

Éviter d'appliquer le produit sur les fleurs des espèces florales. Un résidu collant peut rester sur les feuilles et fruits après application.

Mélanges extemporanés

Les mélanges extemporanés doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Pour plus de précisions sur la compatibilité des mélanges, veuillez nous consulter.

Préparation de la bouillie et application

ERADICOAT® MAX s'utilise en pulvérisation foliaire après dilution dans l'eau.

Avant de débiter le remplissage de la cuve du pulvérisateur pour préparer la bouillie, s'assurer que celle-ci ne contient aucun résidu liquide ou solide d'un traitement précédent.

Remplir le pulvérisateur avec la moitié du volume d'eau nécessaire et commencer l'agitation. Ajouter la quantité nécessaire d'ERADICOAT® MAX puis compléter le remplissage. S'assurer que le produit est bien mélangé avant l'application. Ne pas stocker de solution diluée. **Ne pas dépasser 15 à 20 ml de produit par litre d'eau en fonction des usages.**

PREVENTION ET GESTION DE LA RÉSISTANCE

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives de la même famille chimique ou ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, l'utilisateur doit raisonner en premier lieu les pratiques agronomiques et respecter les conditions d'emploi du produit. Il est conseillé d'alterner ou d'associer, sur une même parcelle, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'action différents, tant au cours d'une saison culturale que dans la rotation.

MISE EN ŒUVRE REGLEMENTAIRE ET BONNES PRATIQUES

Protection de l'opérateur et du travailleur

Se laver les mains après toute manipulation, utilisation du produit, intervention dans une parcelle préalablement traitée. Ne pas manger, boire, téléphoner ou fumer lors de l'utilisation du produit.

Il convient de rappeler que l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.

En tout état de cause, le port de combinaison de travail dédiée ou d'équipements de protection individuelle (EPI) doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage). Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Rapporter les EPI usagés dans un sac translucide, à votre distributeur partenaire ECO EPI ou faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des produits dangereux.

Pendant toute la durée d'utilisation du produit, veiller à porter une tenue de protection adaptée pour réduire l'exposition.

Pour la protection de l'opérateur, porter :

1/ Dans le cadre d'une application à l'aide d'une lance :

- pendant le mélange/chargement :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - des lunettes ou un écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (*selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application*) ;

OU

 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 et un équipement de protection partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III type PB(3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.
- pendant l'application : sans contact intense avec la végétation, cultures basses (< 50 cm) :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 ;
 - des bottes de protection certifiées EN 13 832-3.
- pendant l'application : sans contact intense avec la végétation, cultures hautes (> 50 cm) :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 avec une capuche ;
 - des bottes de protection certifiées EN 13 832-3.
- pendant l'application : contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 3 avec une capuche ;
 - des bottes de protection certifiées EN 13 832-3.
- pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (*selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application*) ;

OU

 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 et un équipement de protection partiel (blouse) de catégorie III type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

2/ Dans le cadre d'une application à l'aide d'un tracteur :

- pendant le mélange/chargement :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - des lunettes ou un écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3) ;
 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 et un équipement de protection partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III type PB(3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.
- pendant l'application : avec tracteur AVEC cabine – pulvérisation vers le bas et le haut :
 - des gants EN ISO 374-1/A1 à usage unique (EN ISO 374-2 (types A, B ou C)), dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ces cas, les

gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

- un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065.
- **pendant l'application : avec tracteur SANS cabine – pulvérisation vers le bas :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 à usage unique (EN ISO 374-2 (types A, B ou C)), dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;
 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065.
- **pendant l'application : avec tracteur SANS cabine – pulvérisation vers le haut :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 à usage unique (EN ISO 374-2 (types A, B ou C)), dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 avec une capuche.
- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - des lunettes ou un écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3) ;
 - un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 et un équipement de protection partiel (blouse) de catégorie III type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

3/ Dans le cadre d'une application à l'aide d'un pulvérisateur à dos :

- **pendant le mélange/chargement :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 ;
 - des lunettes ou un écran facial certifié EN 166 (CE, sigle 3).
- **pendant l'application :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4 avec une capuche ;
 - des bottes de protection certifiées EN 13 832-3.
- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :**
 - des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) ;
 - une combinaison de protection de catégorie III type 4.

Pour la protection du travailleur, porter :

- un EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065 ;
- des gants EN ISO 374-1/A1 réutilisables (EN 16523-1+A1 (type A)) en cas de contact avec la culture traitée.

Stockage du produit

Conserver le produit uniquement dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, dans un local phytopharmaceutique conforme à la réglementation en vigueur, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver le produit à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante, dans un endroit sec et aéré.

Conserver hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

Nettoyage du pulvérisateur et gestion des fonds de cuve

A la fin de la période d'application du produit, l'intégralité de l'appareil (cuve, circuit, buses...) doit être rincée à l'eau claire. Le rinçage du pulvérisateur, l'épandage ou la vidange du fond de cuve et l'élimination des effluents doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

Élimination du produit et de l'emballage

Réemploi de l'emballage interdit. Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon à l'eau claire en veillant à verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Apporter les emballages ouverts, rincés et égouttés à votre distributeur partenaire d'A.D.I.VA.LO.R ou à un autre service de collecte spécifique.

Pour l'élimination des produits non utilisables, conserver le produit dans son emballage d'origine. Interroger votre distributeur partenaire d'A.D.I.VA.LO.R ou faites appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des déchets dangereux.

CERTIS Europe B.V. est partenaire de la filière A.D.I.VA.LO.R.



En cas de déversement accidentel

Se protéger (EPI) et sécuriser la zone.

Prévenir les pompiers (18 ou 112) en cas de danger immédiat pour l'environnement que vous ne pouvez gérer avec vos propres moyens.

Collecter tout ce qui a pu être en contact avec le produit, terre souillée incluse.

Nettoyer le site et le matériel utilisé, en prenant soin de confiner les effluents générés par l'opération de nettoyage. Les éliminer selon la réglementation en vigueur.

En cas d'incident ou d'accident, appeler le 01.72.11.00.03 (*Carechem, numéro d'urgence 24h/24h*).



AVERTISSEMENT

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage. Ils ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous la responsabilité de l'utilisateur, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces...

Le fabricant garantit la qualité du produit vendu dans son emballage d'origine et stocké selon les conditions préconisées, ainsi que sa conformité à l'Autorisation de Mise sur le Marché délivrée par les Autorités Compétentes françaises.

Pour les denrées issues de cultures protégées avec cette spécialité et destinées à l'exportation, il est de la responsabilité de l'exportateur de s'assurer de la conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.

Toute reproduction totale ou partielle de cette étiquette est interdite. CERTIS ne saurait être tenu en aucun cas pour responsable des conséquences inhérentes à toute copie de cette étiquette, à la diffusion ou à l'utilisation non autorisée de cette dernière.

Appendix 3 – Letter(s) of Access

Not applicable