

REGISTRATION REPORT

Part A

Risk Management

Product code: 030-S-1-A

Product name: OROCIDÉ

Chemical active substance:

Orange oil, 60 g/L

Southern Zone and Interzonal

Zonal Rapporteur Member State: France

NATIONAL ASSESSMENT FRANCE

(label extension including minor uses art.51)

Applicant: Oro Agri International Ltd

Date: 28 May 2022

Table of Contents

1	Details of the application	4
1.1	Application background	4
1.2	Letters of Access	5
1.3	Justification for submission of tests and studies	5
1.4	Data protection claims	5
2	Details of the authorisation decision	5
2.1	Product identity	5
2.2	Conclusion	6
2.3	Substances of concern for national monitoring	6
2.4	Classification and labelling.....	6
2.4.1	Classification and labelling under Regulation (EC) No 1272/2008	6
2.4.2	Standard phrases under Regulation (EU) No 547/2011.....	6
2.4.3	Other phrases (according to Article 65 (3) of the Regulation (EU) No 1107/2009)	6
2.5	Risk management.....	6
2.5.1	Restrictions linked to the PPP	7
2.5.2	Specific restrictions linked to the intended uses	8
2.6	Intended uses (only NATIONAL GAP)	9
3	Background of authorisation decision and risk management	29
3.1	Physical and chemical properties (Part B, Section 2)	29
3.2	Efficacy (Part B, Section 3)	30
3.3	Methods of analysis (Part B, Section 5).....	30
3.3.1	Analytical method for the formulation	30
3.3.2	Analytical methods for residues.....	30
3.4	Mammalian toxicology (Part B, Section 6)	31
3.4.1	Acute toxicity.....	31
3.4.2	Operator exposure	31
3.4.3	Worker exposure	35
3.4.4	Bystander exposure	42
3.4.5	Resident exposure	42
3.4.6	Combined exposure	46
3.5	Residues and consumer exposure (Part B, Section 7).....	46
3.6	Environmental fate and behaviour (Part B, Section 8)	47
3.7	Ecotoxicology (Part B, Section 9)	48
3.8	Relevance of metabolites (Part B, Section 10)	48
4	Conclusion of the national comparative assessment (Art. 50 of Regulation (EC) No 1107/2009)	48

5	Further information to permit a decision to be made or to support a review of the conditions and restrictions associated with the authorisation.....	48
5.1.1	Post-authorisation monitoring.....	49
5.1.2	Post-authorisation data requirements	49
Appendix 1	Copy of the product authorisation	50
Appendix 2	Copy of the product label	85

PART A

RISK MANAGEMENT

1 Details of the application

The company Oro Agri International Ltd has requested a marketing authorisation in France for the product OROCIDÉ (formulation code: 030-S-1-A), containing 60 g/L orange oil¹ as an insecticide, fungicide and acaricide for professional uses.

Appendix 1 of this document provides a copy of the product authorisation.

Appendix 2 of this document contains a copy of the product label (draft as proposed by the applicant).

1.1 Application background

The present registration report concerns the evaluation of Oro Agri International Ltd's application submitted on 27/02/2020 to market OROCIDÉ (030-S-1-A) in France (product uses described under point 2.3). France acted as a zonal Rapporteur Member State (zRMS) for field uses and interzonal Rapporteur Member State (izRMS) for greenhouse uses for this request and assessed the application submitted for the label extension of this product in France and in other Member States (MSs) of the European Union.

The present application (2020-0751) was evaluated in France by the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses), according to the Regulation (EC) no 1107/2009², the implementing regulations, and French regulations. This application was assessed in the context of the zonal procedure for all MSs of the Southern zone for field uses and for all MSs of the European Union for uses under protection, taking into account the worst-case uses ("risk envelope approach")³. When risk mitigation measures were necessary, they are adapted to the situation in France.

The data taken into account are those deemed to be valid either at European level (Review Report and EFSA conclusion) or at zonal/national level. The assessment of OROCIDÉ (030-S-1-A) has been made using endpoints agreed in the EU peer review of orange oil. It also includes assessment of data and information related to OROCIDÉ (030-S-1-A) where those data have not been considered in the EU peer review process.

This part A of the RR presents a summary of essential scientific points upon which recommendations are based and is not intended to show the assessment in detail. The risk assessment conclusions provided in this document are based on the information, data and assessments provided in the Registration Report, Part B Sections 1-10 and Part C, and where appropriate the addendum for France.

The conclusions on the acceptability of risk are based on the criteria provided in Regulation (EU) No 546/2011⁴, and are expressed as "acceptable" or "not acceptable" in accordance with those criteria.

¹ Commission Implementing Regulation (EU) No 1165/2013 of 18 November 2013 approving the active substance orange oil, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

² REGULATION (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

³ SANCO document "risk envelope approach", European Commission (14 March 2011). [Guidance document on the preparation and submission of dossiers for plant protection products according to the "risk envelope approach"; SANCO/11244/2011 rev. 5](#)

⁴ COMMISSION REGULATION (EU) No 546/2011 of 10 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

This document also describes the specific conditions of use and labelling required for France for the registration of OROCIDÉ (030-S-1-A).

1.2 Letters of Access

The applicant is the owner of data which support the approval of orange oil.

1.3 Justification for submission of tests and studies

According to the applicant: « The application in accordance with Art 33 aims to an amendment of an existing authorisation AMM 2180631 in France (label extension in field uses). For this reason, none of the already submitted studies will be re-submitted, according to the recommendation given during the pre-submission meeting. ».

1.4 Data protection claims

Where protection for data is being claimed for information supporting registration of OROCIDÉ (030-S-1-A), it is indicated in the reference lists in Appendix 1 of the Registration Report, Part B Sections 1-7.

2 Details of the authorisation decision

2.1 Product identity

Product code	030-S-1-A
Product name in MS	OROCIDÉ
Authorisation number	2180631
Kind of use	Professional use
Low risk product (article 47)	No
Function	Insecticide Fungicide Acaricide
Applicant	Oro Agri International Ltd
Active substance(s) (incl. content)	Orange oil, 60 g/L
Formulation type	Micro-emulsion [ME]
Packaging	Packaging not changed
Coformulants of concern for national authorisations	-
Restrictions related to identity	-
Mandatory tank mixtures	None
Recommended tank mixtures	None

2.2 Conclusion

The evaluation of the application for OROCIDÉ (030-S-1-A) resulted in the decision **to grant** the authorisation.

2.3 Substances of concern for national monitoring

Refer to 5.1.1.

2.4 Classification and labelling

2.4.1 Classification and labelling under Regulation (EC) No 1272/2008

Classification has not changed.

See Part C for justifications of the classification and labelling proposals.

2.4.2 Standard phrases under Regulation (EU) No 547/2011

SP 1	Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water. Avoid contamination via drains from farmyards and roads.
	For other restrictions refer to 2.5

2.4.3 Other phrases (according to Article 65 (3) of the Regulation (EU) No 1107/2009)

None.

2.5 Risk management

According to the French law and procedures, specific conditions of use are set out in the Decision letter.

The French Order of 4 May 2017⁵ provides that:

- unless otherwise stated in the product authorisation, the pre harvest interval (PHI) is at least 3 days;
- unless otherwise stated in the product authorisation, the minimum buffer zone alongside a water body is 5 metres for products applied through spraying or dusting;
- unless otherwise stated in the product authorisation, the minimum re-entry period is 6 hours for field uses and 8 hours for indoor uses.

Drift reduction measures such as low-drift nozzles are not considered within the decision-making process in France. However, non-spraying buffer zones may be reduced under some circumstances as explained in appendix 3 of the above-mentioned French Order.

⁵ Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, amended by the arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/4/AGRGI632554A/jo/texte> ; <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039686039&categorieLien=id>

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

Finally, the French Order of 12 April 2021⁶ provides that:

- an authorisation granted for a “reference” crop applies also for “related” crops, unless formally stated in the Decision
- the “reference” and “related” crops are defined in Appendix 1 of that French Order.

Thus, at French national level, possible extrapolation of submitted data and the corresponding assessment from “reference” crops to “related” ones are undertaken even if not clearly requested by the applicant in their dRR, and a conclusion is also reached on the acceptability of the intended uses on those “related” crops. The aim of this Order, mainly based on the EU document on residue data extrapolation⁷ is to supply “minor” crops with registered plant protection products.

Therefore the GAP table (Section 2.3) and Decision may include uses on crops not originally requested by the applicant.

The Decision, as reproduced in Appendix 1, takes also into account national provisions, including national mitigation measures.

2.5.1 Restrictions linked to the PPP

The authorisation of the PPP is linked to the following conditions:

Operator protection:	
-	Refer to the Decision in Appendix 1 for the details.
Worker protection:	
-	Refer to the Decision in Appendix 1 for the details.
Bystander and resident protection :	
	For uses on zucchini, gherkin, cucumber, melon, flowering brassica, leek, lettuce, peppers, tomato, legume vegetables (dry), onion, strawberry, carrot, chicory roots, tarragon, parsley, herbal tea (dry), turnip, salsify, leafy brassica, ornamentals, pineapple, rose, respect an unsprayed zone of 3 meters from the extremity of the boom and : - areas where bystanders are present during treatment - areas where residents could be present.
	For uses on citrus, grapevine, peach, apple, ornamental trees and shrubs, avocado, banana, blackcurrant, raspberry, tobacco, passion fruit, guava, kiwi, mango, palm tree, papaya, hop, peach, respect an unsprayed zone of 10 meters from the last treated raw and : - areas where bystanders are present during treatment - areas where residents could be present
Integrated pest management (IPM)/sustainable use:	
	-
Environmental protection	
SP 1	Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water. Avoid contamination via drains from farmyards and roads.
SPe 2	To protect aquatic organisms, do not discharge waste water from soil-less glasshouses directly into surface water.

⁶ <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401456>

⁷ SANCO document “guidance document:- Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs”: SANCO/ 7525/VI/95 - rev.9

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

Field uses and uses in open structures	
SPe 3	To protect aquatic organisms, respect an unsprayed buffer zone of 5 metres ⁸ to surface water bodies for uses on zucchini, gherkin, cucumber, melon, flowering brassica, leek, lettuce, peppers, tomato, legume vegetables (dry), onion, strawberry, carrot, chicory roots, tarragon, parsley, herbal tea (dry), turnip, salsify, leafy brassica, ornamentals, pineapple, tobacco, raspberry, blackcurrant and avocado.
SPe 3	To protect aquatic organisms, respect an unsprayed buffer zone of 20 metres to surface water bodies for uses on citrus, banana, kiwi, rose, peach and for applications from BBCH 70 on apple, guava, mango, papaya, passion fruit, palm tree, ornamental trees and shrubs.
SPe 3	To protect aquatic organisms, respect an unsprayed buffer zone of 50 metres to surface water bodies for uses on hop and for applications to BBCH 69 on apple, guava, mango, papaya, passion fruit, palm tree, ornamental trees and shrubs.
SPe 3	To protect non-target arthropods, respect an unsprayed buffer zone of 5 metres to non-agricultural land for the uses on citrus, banana and for applications to BBCH 69 on apple, guava, mango, papaya, passion fruit, ornamentals trees and shrubs, hop and palm tree.
SPe 8	- Dangerous to bees. To protect bees and pollinating insects, do not apply to crop plants when in flower or during the honeydew production period. Do not use where bees are actively foraging. Do not apply when flowering weeds are present.
For uses in closed structures	- May affect beneficial insects. - Precaution should be taken when introducing pollinators.
Other specific restrictions	
Re-entry period	6 hours (field crops) and 8 hours (greenhouseclosed structures).
Storage	Refer to the first Market Authorisation
Risk mitigation measures	Pre-harvest interval ⁹ : not applicable for ornamentals and tobacco F, 1 or 3 days for others uses-

The other conditions of use specified in the previous evaluations are not changed.

2.5.2 Specific restrictions linked to the intended uses

Some of the authorised uses are linked to the following conditions in addition to those listed under point 2.5.1 (mandatory labelling): NONE

⁸ in consistency with French Order of 4 May 2017 (Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime), modified by the French Order of 27 December 2019.

⁹ According to the French Order of 4th May 2017, PHI cannot be lower than 3 days unless specifically stated in the assessment and decision.

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

2.6 Intended uses (only NATIONAL GAP)

Please note: The GAP Table below reports the intended uses proposed by the applicant, and possible extrapolation according to French Order of 26 March 2014 (highlighted in green), evaluated and concluded as safe uses by France as zRMS and izRMS. Those uses are then granted in France.

When the conclusion is “not acceptable”, the intended use is highlighted in grey and the main reason(s) reported in the remarks.

When a use is “acceptable” with GAP restrictions, the modifications of the GAP are in bold.

Use should be crossed out when the applicant no longer supports this use.

GAP rev. 1, date: 03.2022

PPP (product name/code): OROCIDÉ / 030-S-1-A
Active substance: Orange oil
Safener: -
Synergist: -
Applicant: Oro Agri International Ltd
Zone(s): Southern Zone ^(d)
Verified by MS: Yes
Field of use: Insecticide/Fungicide/Acaricide

Formulation type: ME ^(a, b)
Conc. of a.s. 1: 60 g/L ^(c)
Conc. of safener: -
Conc. of synergist: -
Professional use: ☒
Non-professional use: ☐

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
1	FR	Citrus	F	Mites	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	500 - 1000	1	Acceptable Efficacy demonstrated on <i>Phyllocoptruta oleivora</i> and <i>Polyphagotarsonemus latus</i> Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
2	FR	Citrus	F	Leafhoppers (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
3	FR	Citrus	F	Mealybugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
4	FR	Citrus	F	Psillyds	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
5	FR	Citrus	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
6 (minor use art.51)	FR	Citrus	F	Whiteflies	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
7	FR	Cabbage	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
7	FR	Brassica vegetables	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
8	FR	Brassica vegetables	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
8	FR	Brassica vegetables	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
9	FR	Zucchini	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 3 b) 3	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 6	a) 120 b) 360	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
9	FR	Zucchini	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 3 b) 3	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 6	a) 120 b) 360	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
10	FR	Gherkin	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
10	FR	Gherkin	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
11	FR	Cucumber	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
11	FR	Cucumber	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
12	FR	Cucumber	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
12	FR	Cucumber	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
13	FR	Zucchini	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
13	FR	Zucchini	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
14	FR	Gherkin	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
14	FR	Gherkin	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, F _n , F _{pn} , G, G _n , G _{pn} or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
15	FR	Cucumber	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
15	FR	Cucumber	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
16	FR	Strawberry	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	200 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
16	FR	Strawberry	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	200 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
17	FR	Strawberry	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	200 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
17	FR	Strawberry	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	200 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
18	FR	Legume vegetables (dry)	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	200 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
18	FR	Legume vegetables (dry)	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	200 - 500	1	Not finalized for field and tunnel (bees) Max. concentration: 0.8% v/v
19	FR	Melon	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
19	FR	Melon	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Not finalized for field and tunnel (bees) Max. concentration: 0.4% v/v
20	FR	Melon	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
20	FR	Melon	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
21	FR	Melon	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
21	FR	Melon	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
22	FR	Onion	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3.2 b) 19.2	a) 192 b) 1152	200 - 400	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
22	FR	Onion	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3.2 b) 19.2	a) 192 b) 1152	200 - 400	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
23	FR	Leek	G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6.4 b) 38.4	a) 384 b) 2304	500 - 800	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
23	FR	Leek	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6.4 b) 38.4	a) 384 b) 2304	500 - 800	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
24	FR	Pepper	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
24	FR	Pepper	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
25	FR	Apple	F	Psyllid (larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.8 b) 16.8	a) 168 b) 1008	300 - 700	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
26	FR	Apple	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.8 b) 16.8	a) 168 b) 1008	300 - 700	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
27	FR	Apple	F	Leafhoppers (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
28	FR	Tomato Eggplant	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
28	FR	Tomato Eggplant	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
29	FR	Tomato Eggplant	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.8% v/v
29	FR	Tomato Eggplant	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
30	FR	Grapevine	F	Leafhoppers (Tested on <i>Empoasca vitis</i> and <i>Metcalfa pruinosa</i>)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.6 b) 9.6	a) 96 b) 576	100 - 200	1	Acceptable Efficacy demonstrated on <i>Empoasca vitis</i> et <i>Metcalfa pruinosa</i> Max. concentration: 0.8% v/v
31	FR	Grapevine	F	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.6 b) 9.6	a) 96 b) 576	100 - 200	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
32	FR	Grapevine	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.6 b) 9.6	a) 96 b) 576	100 - 200	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
33 (minor use art.51)	FR	Grapevine	F	Erineum leaf mite	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 2 b) 2	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 4	a) 120 b) 240	200	1	Acceptable Max. concentration: 1% v/v
34 (minor use art.51)	FR	Grapevine	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.6 b) 9.6	a) 96 b) 576	100 - 200	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
35	FR	Carrot Parsnip Celeriac Salsify	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 400	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
35	FR	Carrot Parsnip Celeriac Salsify	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 400	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
36	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	G	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
36	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	F/G	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
37	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
37	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
38	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable only for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
38	FR	Lettuce Lamb's lettuce Escaroles Roman rocket	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
39	FR	Peach Apricots Nectarine	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 80-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	300 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
40 (minor use art.51)	FR	Pineapple	F	Mealybugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
41 (minor use art.51)	FR	Ornamental trees and shrubs	F	Leafhoppers (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	200 - 1000	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
42	FR	Ornamental trees and shrubs x	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6.4 b) 38.4	a) 384 b) 2304	200 - 800	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
43	FR	Ornamental trees and shrubs	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	300 - 1000	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
44 (minor use art.51)	FR	Avocado	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 0.8 b) 4.8	a) 48 b) 288	100	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
45 (minor use art.51)	FR	Avocado	F	Mealybugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 0.8 b) 4.8	a) 48 b) 288	100	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
46(minor use art.51)	FR	Avocado	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 0.8 b) 4.8	a) 48 b) 288	50 - 100	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
47 (minor use art.51)	FR	Avocado	F	Lace bugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1 b) 6	a) 60 b) 360	50 - 100	1	Acceptable Max. concentration: 1% v/v
48 (minor use art.51)	FR	Banana	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 250	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
49 (minor use art.51)	FR	Banana	F	Mealybugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 250	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
50 (minor use art.51)	FR	Banana	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	200 - 250	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
51 (minor use art.51)	FR	Blackcurrant Blueberry Redcurrant	F	Mites (Tested on <i>Cecidophyopsis ribis</i>)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 2 b) 2	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 4	a) 120 b) 240	200	1	Acceptable Max. concentration: 1% v/v
52 (minor use art.51)	FR	Blackcurrant Blueberry Redcurrant	F	Leafhoppers (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 300	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
53 (minor use art.51)	FR	Blackcurrant Blueberry Redcurrant	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 300	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
54 (minor use art.51)	FR	Ornamentals	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
55 (minor use art.51)	FR	Ornamentals	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6.4 b) 38.4	a) 384 b) 2304	200 - 800	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
56 (minor use art.51)	FR	Ornamentals	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	300 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
57 (minor use art.51)	FR	Ornamentals	F/G	Rust	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 3 b) 3	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 24	a) 480 b) 1440	500 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
58 (minor use art.51)	FR	Raspberry Blackberry	F	Mites (Tested on <i>Phyllocoptes gracilis</i>)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 2 b) 2	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 4	a) 120 b) 240	200	1	Acceptable Max. concentration: 1% v/v
59 (minor use art.51)	FR	Raspberry Blackberry	F	Leafhoppers (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 300	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
60	FR	Raspberry Blackberry	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2.4 b) 14.4	a) 144 b) 864	100 - 300	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
61 (minor use art.51)	FR	Passion fruit	F	Mites (Tested on <i>Phyllocoptruta oleivora</i> and <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Foliar spray	BBCH 12-70	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
62 (minor use art.51)	FR	Passion fruit	F	Mealybugs (Larvae)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
63 (minor use art.51)	FR	Passion fruit	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
6 (minor use art.51) ⁴	FR	Guava	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
65 (minor use art.51)	FR	Kiwi	F	Leafhoppers (Larvae)	Foliar spray	BBCH 75-81	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
66 (minor use art.51)	FR	Mango	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
67 (minor use art.51)	FR	Mango	F	Mealybugs (Larvae)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
68 (minor use art.51)	FR	Mango	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
69 (minor use art.51)	FR	Mango	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
70 (minor use art.51)	FR	Palm tree	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
71 (minor use art.51)	FR	Papaya	F	Mites (Tested on <i>Phyllocoptruta oleivora</i> and <i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	Foliar spray	BBCH 12-70	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
72 (minor use art.51)	FR	Papaya	F	Mealybugs (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 70-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
73	FR	Papaya	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
74 (minor use art.51)	FR	Rose	F/G	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 4 b) 24	a) 240 b) 1440	300 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
75 (minor use art.51)	FR	Rose	F/G	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 8 b) 48	a) 480 b) 2880	500 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
76	FR	Rose	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	300 - 1000	N.A.	Not acceptable for greenhouse (worker) Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn, G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
77 (minor use art.51)	FR	Tobacco	F	White flies (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 500	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
78 (minor use art.51)	FR	Tobacco	F	Thrips (Larvae and adults)	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3.2 b) 19.2	a) 192 b) 1152	100 - 400	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.8% v/v
79 (minor use art.51)	FR	Tobacco	F	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	100 - 500	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
80 (minor use art.51)	FR	Tobacco	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-77	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	100 - 500	N.A.	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
81 (minor use art.51)	FR	Chicory (roots production)	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
82 (minor use art.51)	FR	Leafy cabbage	F	Rust	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 400	1	Acceptable for permanent greenhouse Max. concentration: 0.5% v/v
82 (minor use art.51)	FR	Leafy cabbage	F	Rust	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 2 b) 12	a) 120 b) 720	100 - 400	1	Acceptable Max. concentration: 0.5% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, Fn, Fpn G, Gn, Gpn or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
83 (minor use art.51)	FR	Tarragon	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
83 (minor use art.51)	FR	Tarragon	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
84 (minor use art.51)	FR	Parsley	G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.8 b) 10.8	a) 108 b) 648	100 - 300	1	Acceptable for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
84 (minor use art.51)	FR	Parsley	F/G	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 1.8 b) 10.8	a) 108 b) 648	100 - 300	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
85 (minor use art.51)	FR	Hop	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 40-89	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 6 b) 36	a) 360 b) 2160	500 - 1000	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v
86 (minor use art.51)	FR	Herbal infusions (dry)	G	Fungal diseases	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable for permanent greenhouse Max. concentration: 0.6% v/v
86 (minor use art.51)	FR	Herbal infusions (dry)	F/G	Fungal diseases	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v

030-S-1-A / OROCIDÉ
Part A - National Assessment
FRANCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Use-No. ^(e)	Member state(s)	Crop and/or situation (crop destination / purpose of crop)	F, F _n , F _{pn} , G, G _n , G _{pn} or I	Pests or Group of pests controlled (additionally: developmental stages of the pest or pest group)	Application				Application rate			PHI (days)	RMS CONCLUSION Remarks: e.g. g safener/synergist per ha ^(f)
					Method / Kind	Timing / Growth stage of crop & season	Max. number a) per use b) per crop/season	Min. interval between applications (days)	kg or L product / ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	g or kg as/ha a) max. rate per appl. b) max. total rate per crop/season	Water L/ha min / max		
87 (minor use art.51)	FR	Turnip	G	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3.2 b) 19.2	a) 192 b) 1152	300 - 800	1	Acceptable for permanent greenhouse Max. concentration: 0.4% v/v
87 (minor use art.51)	FR	Turnip	F/G	Downy mildew	Foliar spray	BBCH 12-49	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3.2 b) 19.2	a) 192 b) 1152	300 - 800	1	Acceptable Max. concentration: 0.4% v/v
88 (minor use art.51)	FR	Salsify	F	Powdery mildew	Foliar spray	BBCH 12-69	a) 6 b) 6	a) 7 days b) 7 days	a) 3 b) 18	a) 180 b) 1080	300 - 500	1	Acceptable Max. concentration: 0.6% v/v

Remarks table heading:

(a) e.g. wettable powder (WP), emulsifiable concentrate (EC), granule (GR)
 (b) Catalogue of pesticide formulation types and international coding system CropLife International Technical Monograph n°2, 6th Edition Revised May 2008
 (c) g/kg or g/l

(d) Select relevant
 (e) Use number(s) in accordance with the list of all intended GAPs in Part B, Section 0 should be given in column 1
 (f) No authorisation possible for uses where the line is highlighted in grey, Use should be crossed out when the notifier no longer supports this use.

030-S-1-A / OROCIDÉ

Part A - National Assessment

FRANCE

Remarks	1	Numeration necessary to allow references	7	Growth stage at first and last treatment (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), including where relevant, information on season at time of application
	2	Use official codes/nomenclatures of EU Member States	8	The maximum number of application possible under practical conditions of use must be provided.
columns:	3	For crops, the EU and Codex classifications (both) should be used; when relevant, the use situation should be described (e.g. fumigation of a structure)	9	Minimum interval (in days) between applications of the same product
	4	F: professional field use, Fn: non-professional field use, Fpn: professional and non-professional field use, G: professional greenhouse use, Gn: non-professional greenhouse use, Gpn: professional and non-professional greenhouse use, I: indoor application	10	For specific uses other specifications might be possible, e.g.: g/m ³ in case of fumigation of empty rooms. See also EPPO-Guideline PP 1/239 Dose expression for plant protection products.
	5	Scientific names and EPPO-Codes of target pests/diseases/ weeds or, when relevant, the common names of the pest groups (e.g. biting and sucking insects, soil born insects, foliar fungi, weeds) and the developmental stages of the pests and pest groups at the moment of application must be named.	11	The dimension (g, kg) must be clearly specified. (Maximum) dose of a.s. per treatment (usually g, kg or L product/ha).
	6	Method, e.g. high volume spraying, low volume spraying, spreading, dusting, drench Kind, e.g. overall, broadcast, aerial spraying, row, individual plant, between the plants - type of equipment used must be indicated.	12	If water volume range depends on application equipments (e.g. ULVA or LVA) it should be mentioned under "application: method/kind".
			13	PHI - minimum pre-harvest interval
			14	Remarks may include: Extent of use/economic importance/restrictions

3 Background of authorisation decision and risk management

3.1 Physical and chemical properties (Part B, Section 2)

The physico-chemical properties of the formulation have been evaluated taken into account the concentration of uses (concentration from 0.4 % to 2 %) and considered acceptable during the registration of this formulation.

The concentrations of uses requested for this extension of uses (concentration from 0.4 % to 1 %) are covered by previous assessment.

The tests of physical and chemical properties were performed on the representative formulation PREV-AM and not on the formulation OROCIDÉ (030-S-1-A). The difference of the composition between PREV-AM and OROCIDÉ (030-S-1-A) can affect the surface tension of the formulation.

All studies have been performed in accordance with the current requirements and the results are deemed to be acceptable. The appearance of the product is that of green liquid, with a citrus odour. It is not explosive, has no oxidising properties. The product is not flammable. It has a self ignition temperature of 431°C. In aqueous solution, it has a pH value around 8.02 at ambient temperature. There is no effect of low and high temperature on the stability of the formulation, since after 7 days at 0 °C and 14 days at 54 °C, neither the active ingredient content nor the technical properties were changed. The stability data indicate a shelf life of at least 2 years at ambient temperature when stored in its sealed packaging (PE). Its technical characteristics are acceptable for a micro emulsion formulation. Nevertheless, as a soluble precipitate was formed, the mention “**shake before use**” must be reported on the label.

Depending on the uses, maximum concentrations are ranged from 0,4% to 1% v/v.

The persistent foaming is in the acceptable range at 0.8 % (v/v) after adding an antifoam at 0.001 %(w/v),

information on the label:

“Shake before use”

3.2 Efficacy (Part B, Section 3)

For minor uses eligible to the application of Article 51 of the Regulation (EC) No 1107/2009, verification of the efficacy and absence of possible risk of phytotoxicity on these crops is not necessary. For the uses other than those eligible to the application of Article 51, **the efficacy level of OROCIDÉ (030-S-1-A) is considered as partial and variable**. However it is considered as acceptable this type of product based on plant extracts.

For the uses other than those eligible to the application of Article 51, the phytotoxicity level of OROCIDÉ (030-S-1-A) is considered as acceptable.

The risks of negative impact on yield, quality, transformation processes (wine-making and cider-making), propagation, succeeding and adjacent crops are considered as negligible.

Considering the data submitted, particular attention should be paid to the conditions of use of the product as part of the implementation of an IPM program, in terms of biological compatibility with biological control agents.

The risk of resistance developing or appearing to orange oil does not require a monitoring for the requested uses.

3.3 Methods of analysis (Part B, Section 5)

The uses are covered by the previous assessment.

3.3.1 Analytical method for the formulation

Analytical method for the determination of the active substance in the formulation is available and validated. As the active substance orange oil does not contain relevant impurity, no analytical method is required.

3.3.2 Analytical methods for residues

According to EU reg. Reg. (EU) No 588/2014 no residue definition and no MRL were set for plant and foodstuff of animal origin. Analytical methods for the determination of residues of orange oil in plant and foodstuffs of animal origin are not necessary.

According to the Efsa conclusions 2013;11 (2); 3090, no residue definition is set for soil (not relevant), so an analytical method for the determination of residues in soil is not necessary.

For outdoor uses, according to the eco-toxicological unit at France level, there is no residue definition for water and air, analytical methods fully validated for the determination of orange oil residues in water and air are not necessary.

For indoor uses, according to the eco-toxicological unit at France level and to Efsa conclusions 2013;11 (2); 3090, the residue definition for water and air is open and analytical methods fully validated for the determination of orange oil residues in water with an ILV and in air are necessary.

The active substance(s) are/is neither toxic nor very toxic hence no analytical method is required for the determination of residues in biological fluids and tissues.

3.4 Mammalian toxicology (Part B, Section 6)

3.4.1 Acute toxicity

3.4.2 Operator exposure

Field

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Brassica vegetables – legume vegetables : 6 x 4L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.240 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight: 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.280	45.27
	PPE # work wear	0.1624	28.49
	PPE # work wear + gloves	0.0072	1.26
Bulb vegetables: 6 x 3.2 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight: 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.2169	38.05
	PPE # work wear	0.1357	23.81
	PPE # work wear + gloves	0.0060	1.05
Cane fruits: 6 x 2,4 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.2559	44.89
	PPE # work wear	0.0907	15.91
	PPE # work wear + gloves	0.0240	4.21

Orchards (citrus fruits, pome fruits, stone fruit, tropical fruits): 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7928	139.09
	PPE # work wear	0.2614	45.86
	PPE # work wear + gloves	0.0778	13.64
Fruiting vegetables: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.4438	77.85
	PPE # work wear	0.2841	49.84
	PPE # work wear + gloves	0.0127	2.23
Grapes: 6 x 1.6L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.096kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.1754	30.77
	PPE # work wear	0.0637	11.17
	PPE # work wear + gloves	0.0162	2.84
Tobacco: 6 x 3.2L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.3348	58.74
	PPE # work wear	0.1167	20.47
	PPE # work wear + gloves	0.0317	5.57
Hops : 6 x 6 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.36 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.6043	106.02
	PPE # work wear	0.2028	35.57
	PPE # work wear + gloves	0.0586	10.29

Leaf vegetables: 6 x 6.4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.384 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.3725	65.35
	PPE # work wear	0.2372	41.61
	PPE # work wear + gloves	0.0106	1.85
Low berries: 6 x 4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.24 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.2580	45.27
	PPE # work wear	0.1624	28.49
	PPE # work wear + gloves	0.0072	1.26
Low berries: 6 x 2.4 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.1639	204.19
	PPE # work wear	0.3744	65.69
	PPE # work wear + gloves	0.1159	20.33
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight: 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.3298	57.86
	PPE # work wear	0.1625	28.50
	PPE # work wear + gloves	0.0050	0.88
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted - Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7928	139.09
	PPE # work wear	0.2614	45.86
	PPE # work wear + gloves	0.0778	13.64

Root: 6 x 3 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying			
Application rate		6 x 0.18 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.2063	36.19
	PPE # work wear	0.1289	22.61
	PPE # work wear + gloves	0.0057	1

Greenhouse

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Brassica vegetables – legume vegetables : 6 x 4L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.240 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight: 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7805	136.94
	PPE # work wear	0.0658	11.54
	PPE # work wear + gloves	0.0159	2.79
Bulb vegetables: 6 x 3.2 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight: 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7453	130.75
	PPE # work wear	0.0570	10.01
	PPE # work wear + gloves	0.0154	2.70
Fruiting vegetables: 6 x 8 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.9109	159.8
	PPE # work wear	0.1054	18.5
	PPE # work wear + gloves	0.0180	3.15
Leaf vegetables: 6 x 6.4 L/ha Handheld spraying – Downward spraying			

Application rate		6 x 0.384 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.1294	198.13
	PPE # work wear	0.1541	27.04
	PPE # work wear + gloves	0.1077	18.9
Low berries: 6 x 4 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.24 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7805	136.94
	PPE # work wear	0.0658	11.54
	PPE # work wear + gloves	0.0159	2.79
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Handheld spraying – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.14083	247.07
	PPE # work wear	0.1908	33.48
	PPE # work wear + gloves	0.1346	23.62
Root: 6 x 2.4 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
Spray application (AOEM; 95 th percentile) Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.7036	123.44
	PPE # work wear	0.0479	8.40
	PPE # work wear + gloves	0.0149	2.61

3.4.3 Worker exposure

Field

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Brassica vegetables – legume vegetables : 6 x 4L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			

Application rate		6 x 0.240 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6210	284.39
	PPE # work wear	0.6987	122.58
	PPE # work wear + gloves	0.1621	28.44
Bulb vegetables: 6 x 3.2 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.2968	227.51
	PPE # work wear	0.5590	98.06
	PPE # work wear + gloves	0.1297	22.75
Cane fruits: 6 x 2,4 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 22500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.7730	661.93
	PPE # work wear	0.7546	132.39
	PPE # work wear + gloves	0.3773	66.19
Orchards (citrus fruits, pome fruits, stone fruit, tropical fruits): 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 22500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	12.5767	2206.44
	PPE # work wear	2.5153	441.29
	PPE # work wear + gloves	1.2577	220.64
Fruiting vegetables: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.2420	568.77
	PPE # work wear	1.3974	245.16
	PPE # work wear + gloves	0.3242	56.88
Grapes: 6 x 1.6L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			

Application rate		6 x 0.096kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 30000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.3538	588.38
	PPE # work wear	1.1291	198.09
	PPE # work wear + gloves	-	-
Tobacco: 6 x 3.2L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 3000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	6.7076	1176.77
	PPE # work wear	2.2582	396.18
	PPE # work wear + gloves	-	-
Hops : 6 x 6 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.36 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 2 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 12500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.3101	229.84
	PPE # work wear	0.1467	25.74
	PPE # work wear + gloves	-	-
Leaf vegetables: 6 x 6.4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.384 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	2.5936	455.02
	PPE # work wear	1.1179	196.13
	PPE # work wear + gloves	0.2594	45.50
Low berries: 6 x 4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.24 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6210	284.39
	PPE # work wear	0.8384	147.10
	PPE # work wear + gloves	0.2096	36.77
Low berries: 6 x 2.4 L/ha			

Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.9726	170.63
	PPE # work wear	0.5031	88.26
	PPE # work wear + gloves	0.1258	22.06
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward and upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 14000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	7.8255	1372.90
	PPE # work wear	2.7948	490.32
	PPE # work wear + gloves	0.7826	137.29
Root: 6 x 3 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying			
Application rate		6 x 0.18 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 2 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 12500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.6550	114.92
	PPE # work wear	0.0734	12.87
	PPE # work wear + gloves	-	-

Tier II

Orange oil			
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Orchards (citrus fruits, pome fruits, stone fruit, tropical fruits): 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 22500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.0478	534.70
	PPE # work wear	0.6096	106.94
	PPE # work wear + gloves	0.3048	53.47
Grapes: 6 x 1.6L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.096kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010	no PPE (potential exposure)	0.0141	2.47

8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 30000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	PPE # work wear	0.0047	0.83
	PPE # work wear + gloves	-	-
Tobacco: 6 x 3.2L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 30000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6255	285.18
	PPE # work wear	0.5473	96.01
	PPE # work wear + gloves	-	-
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward and upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 14000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.8964	332.70
	PPE # work wear	0.6773	118.82
	PPE # work wear + gloves	0.1896	33.27

A DFR study was provided and was considered acceptable.

A refinement of the DFR and the DT50 was only acceptable for grapes crops since it was the only crop tested in the study.

However, due to the high volatility of the orange oil substance, the refinement of the DT50 is applicable to all crops.

Worker exposure was re-assessed using the following values :

DFR : 0.052 µg D-limonene/cm² of foliage /kg a.s. applied per ha (for grapes)

DFR : 3 µg D-limonene/cm² of foliage /kg a.s. applied per ha (for tobacco, orchards, ornamental)

DT50 : 1 day

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Orchards (citrus fruits, pome fruits, stone fruit, tropical fruits): 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	

EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 22500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.0478	534.70
	PPE # work wear	0.6096	106.94
	PPE # work wear + gloves	0.3048	53.47
Grapes: 6 x 1.6L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.096kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 30000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.0141	2.47
	PPE # work wear	0.0047	0.83
	PPE # work wear + gloves	-	-
Tobacco: 6 x 3.2L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 30000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6255	285.18
	PPE # work wear	0.5473	96.01
	PPE # work wear + gloves	-	-
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward and upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ ,	no PPE (potential exposure)	1.8964	332.70
	PPE # work wear	0.6773	118.82

TC: 14000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	PPE # work wear + gloves	0.1896	33.27
---	--------------------------	--------	-------

Worker exposure is acceptable with the wear of PPE.

Greenhouse

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Brassica vegetables – legume vegetables : 6 x 4L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.240 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6258	285.23
	PPE # work wear	0.7035	123.42
	PPE # work wear + gloves	0.1669	29.28
Bulb vegetables: 6 x 3.2 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.3006	228.18
	PPE # work wear	0.5628	98.74
	PPE # work wear + gloves	0.1335	23.42
Fruiting vegetables: 6 x 8 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	3.2516	570.46
	PPE # work wear	1.4070	246.84
	PPE # work wear + gloves	0.3338	58.56
Leaf vegetables: 6 x 6.4 L/ha Handheld spraying – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.384 kg a.s./ha	

EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	2.6013	456.36
	PPE # work wear	1.1256	197.48
	PPE # work wear + gloves	0.2670	46.85
Low berries: 6 x 4 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.24 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 5800 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	1.6258	285.23
	PPE # work wear	0.8432	147.94
	PPE # work wear + gloves	0.2144	37.62
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Handheld spraying – Downward spraying			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 8 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 14000 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	7.8351	1374.58
	PPE # work wear	2.8044	492.00
	PPE # work wear + gloves	0.7922	138.97
Root: 6 x 2.4 L/ha Handheld spraying – Upward spraying			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
EFSA Journal 2010 2 hours/day ⁽¹⁾ , TC: 12500 cm ² /person/h ⁽²⁾ Body weight : 60 kg	no PPE (potential exposure)	0.5248	92.06
	PPE # work wear	0.0594	10.42
	PPE # work wear + gloves	-	-

The worker exposure is acceptable with the wear of PPE except for ornamental crops.

3.4.4 Bystander exposure

Covered by resident exposure.

3.4.5 Resident exposure

For Covered uses: the exposure of bystanders and residents for the indoor scenario is considered negligible.

Field use

		Orange oil	
Model data	Level of PPE	Total absorbed dose (mg/kg/day)	% of systemic MSDI
Brassica vegetables – legume vegetables : 6 x 4L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying Drift 2-3m			
Application rate		6 x 0.240 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg		0.1429	25.08
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg		0.0643	11.28
Bulb vegetables: 6 x 3.2 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying Drift 2-3m			
Application rate		6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg		0.1076	18.88
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg		0.0501	8.78
Cane fruits: 6 x 2,4 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m			
Application rate		6 x 0.144 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg		0.1656	29.05
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg		0.860	15.09
Orchards (citrus fruits, pome fruits, stone fruit, tropical fruits): 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m			
Application rate		6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg		0.2892	50.73
EFSA model		0.1521	26.68

Residents (children)* Body weight: 10 kg		
Fruiting vegetables: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying Drift 2-3m		
Application rate	6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.2367	41.53
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.1183	20.75
Grapes: 6 x 1.6L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m		
Application rate	6 x 0.096kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.1156	20.27
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0584	10.25
Tobacco: 6 x 3.2L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m		
Application rate	6 x 0.192 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.1333	23.39
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0683	11.98
Hops : 6 x 6 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m		
Application rate	6 x 0.36 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.2116	37.12
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.1109	19.45

Leaf vegetables: 6 x 6.4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying Drift 2-3m		
Application rate	6 x 0.384 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.1873	32.86
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0942	16.53
Low berries: 6 x 4 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying Drift 2-3m		
Application rate	6 x 0.24 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.1305	22.90
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0617	10.83
Low berries: 6 x 2.4 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m		
Application rate	6 x 0.144 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.1656	29.05
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0860	15.09
Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Downward spraying Drift 2-3m		
Application rate	6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.2450	42.98
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.1200	21.05

Ornamentals / Ornamental trees: 6 x 8 L/ha Vehicle-mounted – Upward spraying Drift 10m		
Application rate	6 x 0.48 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.3612	63.37
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.1942	34.06
Root: 6 x 3 L/ha Vehicle-mounted - Downward spraying Drift 2-3m		
Application rate	6 x 0.18 kg a.s./ha	
EFSA model Residents (adult)* Body weight: 60 kg	0.0988	17.33
EFSA model Residents (children)* Body weight: 10 kg	0.0465	8.16

* All pathway (mean)

In conclusions Resident exposure is acceptable

3.4.6 Combined exposure

Not necessary.

3.5 Residues and consumer exposure (Part B, Section 7)

As ornamentals, rose, ornamental trees and shrubs, and tobacco are non edible commodities, the respective intended uses were not assessed.

The data available are considered sufficient for risk assessment. Orange oil is included in Annex IV of regulation (EC) No 396/2005. Therefore estimation of exposure through diet and other means is not considered as relevant and it is considered that the use of orange oil do not represent unacceptable acute and chronic risks for the consumer.

As far as consumer health protection is concerned, France agrees with the authorization of the intended uses.

According to available data, no specific mitigation measures should apply.

Data gaps

No data gaps.

Information on OROCID (030-S-1-A)

Crop	PHI for OROCID proposed by applicant	PHI/ Withholding period* sufficiently supported for orange oil	PHI for OROCID proposed by zRMS	zRMS Comments (if different PHI proposed)
Citrus	1 day	Yes	1 day	
Brassica vegetables	1 day	Yes	1 day	
Zucchini, gherkin, cucumber	1 day	Yes	1 day	
Strawberry	1 day	Yes	1 day	
Legume vegetables (dry)	1 day	Yes	3 days	
Melon	1 day	Yes	1 day	
Onion	1 day	Yes	1 day	
Leek	1 day	Yes	1 day	
Pepper	1 day	Yes	1 day	
Apple	1 day	Yes	3 days	
Tomato	1 day	Yes	1 day	
Grapevine	1 day	Yes	3 days	
Carrot	1 day	Yes	1 day	
Lettuce	1 day	Yes	1 day	
Peach	1 day	Yes	3 days	
Pineapple	1 day	Yes	1 day	
Avocado	1 day	Yes	3 days	
Banana	1 day	Yes	1 day	
Blackcurrant, raspberry	1 day	Yes	1 day	
Passion fruit	1 day	Yes	1 day	
Guava	1 day	Yes	1 day	
Kiwi	1 day	Yes	1 day	
Mango	1 day	Yes	3 days	
Palm tree	1 day	Yes	3 days	
Papaya	1 day	Yes	3 day	
Chicory (root production)	1 day	Yes	3 day	
Tarragon	1 day	Yes	1 day	
Parsley	1 day	Yes	1 day	
Hop	1 day	Yes	3 days	
Herbal tea (dry)	1 day	Yes	1 day	
Turnip	1 day	Yes	3 days	
Salsify	1 day	Yes	3 days	

3.6 Environmental fate and behaviour (Part B, Section 8)

The fate and behaviour in the environment have been evaluated according to the requirements of Regulation (EC) No 1107/2009. Appropriate endpoints from the EU conclusions were used to calculate PEC values for the active substance for the intended use patterns. In cases where deviations from the EU agreed endpoints were considered appropriate (for example when additional studies are provided), such deviations were highlighted and justified accordingly.

The PEC of d-limonene, lead component of orange oil in soil and surface water have been assessed according to FOCUS guidance documents and the endpoints established in the EU conclusions or agreed in the assessment based on new data provided.

PEC soil and PEC_{sw} derived for the active substance are used for the ecotoxicological risk assessment. PEC_{gw} calculations for orange oil are not considered relevant considering its very high vapour pressure and thus its quick dissipation.

3.7 Ecotoxicology (Part B, Section 9)

The ecotoxicological risk assessment of the formulation was performed according to the requirements of Regulation (EC) No 1107/2009. Appropriate endpoints from the EU conclusions for the active substance(s) and its/their metabolites were used for the intended use patterns. In cases where deviations from the EU agreed endpoints were considered appropriate (for example when additional studies are provided), such deviations were highlighted and justified accordingly.

Based on the guidance documents, the risks for birds, aquatic organisms, mammals and other non-target arthropods, earthworms, other soil macro-organisms and micro-organisms and terrestrial plants are acceptable for the intended uses. Risk mitigations are required for aquatic organisms and non-target arthropods.

According to new requirements of Reg. No. 284/2013, **information on chronic effects on adult bees and on development of bees should have been submitted as exposure of bees to the formulation cannot be excluded.** In absence of these data, the risk for bees can not be finalized for uses other than permanent greenhouse.

3.8 Relevance of metabolites (Part B, Section 10)

An assessment was conducted according to the SANCO/221/2000 guidance document. Please refer to environmental fate and behaviour above for conclusion on the risk of groundwater contamination.

4 Conclusion of the national comparative assessment (Art. 50 of Regulation (EC) No 1107/2009)

The active substance orange oil is not approved as a candidate for substitution, therefore a comparative assessment is not foreseen.

5 Further information to permit a decision to be made or to support a review of the conditions and restrictions associated with the authorisation

When the conclusions of the assessment is “Not acceptable”, please refer to relevant summary under point 3, “Background of authorisation decision and risk management”.

5.1.1 Post-authorisation monitoring

None.

5.1.2 Post-authorisation data requirements

None.

Appendix 1 Copy of the product authorisation

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C



Décision relative à une demande d'extension d'usages d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

Vu la demande d'extension d'usages mineurs et majeurs du produit phytopharmaceutique OROCIDÉ

de la société ORO AGRI INTERNATIONAL LTD

enregistrée sous le n°2020-0751

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 22 décembre 2021,

Vu la décision du Directeur général de l'Anses du 21 mars 2022,

Vu le recours gracieux formé le 18 mai 2022 par la société ORO AGRI INTERNATIONAL LTD,

L'autorisation de mise sur le marché du produit référencé ci-après **est étendue** aux usages décrits dans la présente décision.

La présente décision abroge et remplace la décision du 21 mars 2022 et s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C




Informations générales sur le produit	
Noms du produit	OROCIDÉ PREV-AM ULTRA PREVAM PLUS PREVAM ORO-QUIN
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	ORO AGRI INTERNATIONAL LTD Bankastraat 75 9715CJ GRONINGEN Pays-Bas
Formulation	Micro-émulsion (ME)
Contenant	60 g/L - huile essentielle d'orange
Numéro d'intrant	9874-2015.01
Numéro d'AMM	2180631
Fonction	Insecticide
Gamme d'usage	Professionnel

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 28/06/2022

DocuSigned by:

 AE201AB05AA2454
 Directrice générale déléguée
 en charge du pôle produits réglementés
 Agence nationale de sécurité sanitaire de
 l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12053103 Agrumes*Trt Part.Aer.* Acariens et phytotes	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Efficacité montrée sur <i>Phyllocoptruta oleivora</i> et <i>Polyphagotarsonemus latus</i> . Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12053107 Agrumes*Trt Part.Aer.* Aleurodes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12053119 Agrumes*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12053101 Agrumes*Trt Part.Aer.* Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00203020 Agrumes*Trt Part.Aer.* Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
13053101 Ananas*Trt Part.Aer.* Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
00502025 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer. *Cicadelles, aphrophores et cercopes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	-	50	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
14053204 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.*Oidium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	-	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 77	-	20	-	-	-
00502033 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.*Thrips	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	6,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	-	50	5	-	-
00803006 Avocatier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	0,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	3	5	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
00801021 Avocatier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	0,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00803010 Avocatier*Trt Part.Aer.* Punaises et tigres	1 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
13103101 Avocatier*Trt Part.Aer.* Thrips	0,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00804013 Bananier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

OROCIDE

AMM n°2180631

Page 6 sur 35

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
13153101 Banancier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00804007 Banancier*Trt Part.Aer.* Thrips	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16203201 Carotte*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	2,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
12153101 Cassissier*Trt Part.Aer.* Acariens et phytotes	2 L/ha	2/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12153107 Cassissier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	2,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12153202 Cassissier*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	2,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16353204 Chicorées – Production de racines* Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
00516054 Choux feuillus* Trt Part.Aer.*Rouille(s)	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
Egalement autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
01114028 Choux*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
01114024 Choux*Trt Part.Aer.* Thrips	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
16323103 Cucurbitacées à peau comestible* Trt Part.Aer.*Aleurodes	2 L/ha	3/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Uniquement sur courgette. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16323103 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Uniquement sur cornichon. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Uniquement sur concombre. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
16323203 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	F (BBCH 77)	5	-	-	-
	Uniquement sur courgette. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16323203 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Uniquement sur comichon. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
	Uniquement sur concombre. Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
16323107 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Part.Aer.* Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	F (BBCH 49)	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16753102 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16753205 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	F (BBCH 77)	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16753104 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Part.Aer.* Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	F (BBCH 49)	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
17403102 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.*Aleurodes	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								
17403202 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.*Oïdium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								
17403203 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.*Rouille(s)	8 L/ha	3/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
17403106 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.*Thrips	6,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								
16823201 Fines Herbes*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
	Uniquement sur estragon. Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	1,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
	Uniquement sur persil. Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

OROCIDE

AMM n°2180631

Page 14 sur 35

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16553205 Fraisier*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16553103 Fraisier*Trt Part.Aer.* Thrips	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12353102 Framboisier*Trt Part.Aer.* Acariens et phytoptes	2 L/ha	2/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12353116 Framboisier*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	2,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12353204 Framboisier*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	2,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	1	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00807005 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Acariens	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	50	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00807013 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	50	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
00807013 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
00807010 Fruit de la passion* Trt Part.Aer.*Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12603166 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. Efficacité montrée à 2,8 L/ha sur psylles 6 applications maximum par an et par culture.							
	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. Efficacité montrée à 2,8 L/ha sur psylles. 6 applications maximum par an et par culture.							
	2,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 39	F (BBCH 39)	50	5	-	-
	Efficacité montrée sur psylles. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12603202 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	2,8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00808004 Goyavier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	1	20	-	-	-
15353206 Houblon*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	3	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
15353206 Houblon*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	50	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00517055 Infusions*Trt Part.Aer.* Maladies fongiques	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
12013101 Kiwi*Trt Part.Aer.* Cicadelles, cercopides et psylles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 75 et BBCH 81	1	20	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
16603104 Laitue*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16603207 Laitue*Trt Part.Aer.* Mildiou(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16603208 Laitue*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
00517090 Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Thrips	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
00810012 Manguier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

OROCIDE

AMM n°2180631

Page 21 sur 35

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
00810012 Manguier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
00810013 Manguier*Trt Part.Aer.* Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
00810005 Manguier*Trt Part.Aer.* Oïdium(s)	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
00810010 Manguier*Trt Part.Aer.* Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
16773201 Navet*Trt Part.Aer.* Mildiou(s)	3,2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	3	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
16803102 Oignon*Trt Part.Aer.* Thrips	3,2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	1	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
00811010 Palmiers alimentaires* Trt Part.Aer.*Aleurodes	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	3	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
01271001 Papayer*Trt Part.Aer.* Acariens	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
01271002 Papayer*Trt Part.Aer.* Cochenilles	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
01271004 Papayer*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 69	F (BBCH 69)	50	5	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 70 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.							
12553224 Pêcher - Abricotier*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 80 et BBCH 89	3	20	-	-	-
	Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
16843103 Poireau*Trt Part.Aer.* Thrips	6,4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	1	5	-	-	-
	Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
16863103 Poivron*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
17303117 Rosier*Trt Part.Aer.* Aleurodes	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	-	20	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								
17303203 Rosier*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	-	20	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

**Liste des nouveaux usages autorisés**

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
17303104 Rosier*Trt Part.Aer.* Thrips	8 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	-	20	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture. L'usage est refusé sous abri en raison d'un risque d'effet nocif pour le travailleur.								
16903201 Salsifis*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 69	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								
15853105 Tabac*Trt Part.Aer.* Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
15853202 Tabac*Trt Part.Aer.* Mildiou(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

OROCIDE

AMM n°2180631

Page 27 sur 35

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
15853201 Tabac*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	3 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
15853107 Tabac*Trt Part.Aer.* Thrips	3,2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 49	-	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16953101 Tomate - Aubergine* Trt Part.Aer.*Aleurodes	2 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
16953110 Tomate - Aubergine* Trt Part.Aer.*Thrips	4 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	1	5	-	-	-
Également autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12703121 Vigne*Trt Part.Aer.* Autres cicadelles	1,6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Efficacité montrée sur <i>Empoasca vitis</i> et <i>Metcalfa pruinosa</i> . Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12703115 Vigne*Trt Part.Aer.* Erinose	2 L/ha	2/an	entre les stades BBCH 40 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12703203 Vigne*Trt Part.Aer.* Mildiou(s)	1,6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	F (BBCH 77)	5	-	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								
12703204 Vigne*Trt Part.Aer.* Oidium(s)	1,6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 77	F (BBCH 77)	5	-	-	-
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

Liste des nouveaux usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) (1)
12703141 Vigne*Trt Part.Aer.* Thrips	1,6 L/ha	6/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 89	3	5	-	-	-
Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours. 6 applications maximum par an et par culture.								

(1) : En attente du renouvellement de l'AMM

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C



Liste des usages refusés			
Usages	Dose d'emploi	Nombre maximum d'applications	Délai avant récolte (jours)
00203017 Agrumes*Trt Part.Aer.* Psylle(s)	8 L/ha	6/an	1
	Motivation du refus : L'usage est refusé car transitoire et déjà inclus dans l'usage n° 12053119 Agrumes*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles.		
16403207 Choux*Trt Part.Aer.* Rouille(s)	2 L/ha	6/an	1
	Motivation du refus : L'usage est refusé en l'usage n°00516054 Choux feuillus*Trt Part.Aer.*Rouille(s), mieux adapté à la revendication.		
12613116 Fruits à pépins* Trt Part.Aer.*Psylle(s)	2,8 L/ha	6/an	1
	Motivation du refus : L'usage est refusé car transitoire et déjà inclus dans l'usage n°12603166 Fruits à pépins*Trt Part.Aer.*Cicadelles, cercopides et psylles.		
12703119 Vigne*Trt Part.Aer. *Cicadelles	1,6 L/ha	6/an	1
	Motivation du refus : L'usage est refusé car transitoire et transformé en l'usage n°12703121 Vigne*Trt Part.Aer.*Autres cicadelles conformément aux données disponibles.		

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C



Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles.
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

Les équipements de protection individuelle ci-après sont applicables à tous les usages du produit utilisant ces modes d'application.

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance ou pulvérisateur à dos

• pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

• pendant l'application : sans contact intense avec la végétation

Culture basse (< 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

Culture haute (> 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

• pendant l'application : contact intense avec la végétation

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C



• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe

• **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

• **pendant l'application**

Si application avec tracteur avec cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur pneumatique

• **pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

• **pendant l'application - Pulvérisation vers le haut**

Si application avec tracteur avec cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C

*Si application avec tracteur sans cabine*

- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• *pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation*

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

Pour le travailleur, porter

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A).

Les équipements de protection individuelle ci-dessus sont applicables à tous les usages du produit.

Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :

- 24 heures.

Protection des personnes présentes et des résidents (au sens du règlement (UE) N°284/2013)

Pour les usages sur "cucurbitacées à peau comestible", "cucurbitacées à peau non comestible", "choux", "poireau", "laitue", "poivron", "tomate-aubergine", "légumineuses potagères (sèches)", "oignon", "fraisier", "carotte", "chicorées", "fines herbes", "infusions", "navet", "salsifis", "choux feuillus", "cultures florales et plantes vertes", "ananas", "rosier", respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

Pour les usages sur "agrumes", "bananier", "kiwi", "vigne", "fruits à pépins", "avocatier", "goyavier", "manguier", "papayer", "fruit de la passion", "palmiers alimentaires", "pêcher-abricotier", "houblon", "tabac", "arbres et arbustes", "framboisier", "cassissier", respecter une distance d'au moins 10 mètres entre le dernier rang traité et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

Respect des limites maximales de résidus (LMR)

Le délai avant récolte est fixé à 1 ou 3 jours en fonction des pratiques agricoles sur la culture.

Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)*Protection de la faune*

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface.

DocuSign Envelope ID: 7632D729-DA5D-4E92-9F00-AB0DEB23F21C



- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau, pour les cultures en plein champ et sous abri ouvert pendant le traitement, et pour les usages « cucurbitacées à peau comestible », « cucurbitacées à peau non comestible », « choux », « poireau », « laitue », « poivron », « tomate-aubergine », « cultures florales et plantes vertes », « tabac », « légumineuses potagères (sèches) », « oignon », « vigne », « cassissier », « framboisier », « fraisier », « avocatier », « ananas », « carotte », « chicorées », « fines herbes », « infusions », « navet », « salsifis » et « choux feuillus ».

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport aux points d'eau pour l'usage « houblon » et pour les applications jusqu'à BBCH 69 sur « fruits à pépins », « goyavier », « manguier », « papayer », « fruit de la passion », « arbres et arbustes » et « palmiers alimentaires ».

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages « agrumes », « bananier », « kiwi », « rosier », « pêcher-abricotier » et pour les applications à partir de BBCH 70 sur « fruits à pépins », « goyavier », « manguier », « papayer », « fruit de la passion », « arbres et arbustes » et « palmiers alimentaires ».

- SPe 3 : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages sur « agrumes » et « bananiers » et pour les applications jusqu'à BBCH 69 sur « fruits à pépins », « goyavier », « manguier », « papayer », « fruit de la passion », « arbres et arbustes », « houblon » et « palmiers alimentaires ».

Dans le cadre de structures permanentes :

- Peut porter atteinte à la faune auxiliaire.
- Peut porter atteinte aux insectes pollinisateurs. Eviter toute exposition inutile.

Dans le cas de structures ouvertes pendant le traitement

- SPe 8 : Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.

Recommandations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer les informations suivantes sur l'étiquette :

- Pour les usages mineurs dont l'autorisation de mise sur le marché a été accordée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.
Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.
- L'efficacité du produit étant variable et partielle, préciser les conditions optimales d'utilisation.

Les autres modalités d'autorisation du produit restent inchangées.

Appendix 2 Copy of the product label

The draft product label as proposed by the applicant is reported below. The draft label may be corrected with consideration of any new element. The label shall reflect the detailed conditions stipulated in the Decision.

PROJET D'ÉTIQUETTE – Usages plein champ & sous abris

Dossier : 2015-1147 – ZRMS FRANCE

Nom du produit	OROCIDE
Numéro d'autorisation	2180631
Fonction	Acaricide – Insecticide - Fongicide
Substance(s) active(s) (teneur) & Type de formulation	Huile essentielle d'orange 60 g/L Micro émulsion (ME)
Autres substances	orange, sweet, ext., 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Poids net du produit au litre	<i>Calcul pour chaque contenance d'emballage basé sur une densité du produit de 1.017 – 5 Litres</i>
Numéro de lot et date de production	<i>Imprimé directement sur l'emballage</i>
Fabriquant et Emballeur	 Oro Agri International Ltd – Bankastraal 75 – 9715CJ Groningen - Pays Bas
Distributeur	<i>Non déterminé</i>

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Lire les instructions sur l'étiquette avant utilisation.

INFORMATION PREMIERS SECOURS :

En cas d'urgence : composer le 15 ou le 112 ou contacter le centre antipoison le plus proche et/ou CHEMTREC +1 703-741-5970. Puis signalez vos symptômes au réseau Phyt'attitude, n° vert 0 800 887 887 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Se référer à la fiche de données de sécurité.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles gratuitement sur internet : www.quickfds.com ou auprès du distributeur.

Pictogramme de danger	 GHS05 – GHS07 – GHS09
Danger	DANGER
Mention(s) de danger	H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H332 Nocif par inhalation. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Mention(s) de précaution	<u>Prévention :</u> Conseils de prudence P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. <u>Réponse :</u> P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.. <u>Disposition pour le stockage :</u> P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/récipient dans des installations de combustion industrielles.
Mention(s) d'étiquetage complémentaire(s)	EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique EUH210 – Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH401 – Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. SP 1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

PROTECTION DE L'OPERATEUR ET DU TRAVAILLEUR :

L'utilisation d'un matériel adaptés et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles.

- Le port de la combinaison de travail adéquate ou de l'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage / déshabillage).

- Les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :		GANTS EN NITRILE Réutilisables (certifiés EN 374-3) ou A usage unique (certifiés EN 374-2)	EPI VESTIMENTAIRE 65% polyester / 35% coton >= 230 g/m ² + traitement déperlant	EPI PARTIEL blouse ou tablier à manches longues catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1	COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE catégorie III Type 3 ou 4	LUNETTES ou ECRAN FACIAL certifiés EN166:2002 (CE, sigle 3)	BOTTES certifiées EN 13 832-3
							
APPLICATION AVEC UNE LANCE	MELANGE / CHARGEMENT	Réutilisables	EPI vestimentaire		OU Type 4 ou 3		
	PENDANT L'APPLICATION						
	SANS CONTACT INTENSE AVEC LA VEGETATION - CULTURES BASSES (<50cm)	Réutilisables	EPI vestimentaire				
	SANS CONTACT INTENSE AVEC LA VEGETATION - CULTURES HAUTES (>50cm)	Réutilisables			Type 4 avec capuche		
	AVEC CONTACT INTENSE AVEC LA VEGETATION	Réutilisables			Type 3 avec capuche		
	NETTOYAGE	Réutilisables	EPI vestimentaire ET EPI partiel		OU Type 4 ou 3		
APPLICATION AVEC UN PULVERISATEUR PNEUMATIQUE	MELANGE / CHARGEMENT	Réutilisables	EPI vestimentaire ET EPI partiel				
	PENDANT L'APPLICATION - TRACTEUR AVEC CABINE		EPI vestimentaire				
	PENDANT L'APPLICATION - TRACTEUR SANS CABINE	A usage unique *			Type 4 avec capuche		
	NETTOYAGE	Réutilisables	EPI vestimentaire ET EPI partiel				
APPLICATION AVEC UN PULVERISATEUR A RAMPE	MELANGE / CHARGEMENT	Réutilisables	EPI vestimentaire ET EPI partiel				
	PENDANT L'APPLICATION - TRACTEUR AVEC CABINE		EPI vestimentaire				
	PENDANT L'APPLICATION - TRACTEUR SANS CABINE	A usage unique *					
	NETTOYAGE	Réutilisables	EPI vestimentaire ET EPI partiel				
APPLICATION AVEC UN PULVERISATEUR A DOS	MELANGE / CHARGEMENT	Réutilisables			Type 4		
	PENDANT L'APPLICATION	Réutilisables			Type 4 avec capuche		
	NETTOYAGE	Réutilisables			Type 4		
PROTECTION DU TRAVAILLEUR		Réutilisables	EPI vestimentaire				

* Gants en nitrile à usage unique (certifiés EN 374-2) en cas d'intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas et pour un appareil de pulvérisation avec cabine, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine.

** Protection respiratoire demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre A2P3 (EN 14387) pour les usages sous abri.

PROTECTION DE LA FAUNE :

SPe 2	Pour respecter les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface.
SPe 3 (plein champ)	Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau, pour les usages sur vigne, légumes et plantes ornementales <50 cm, avocatier et arbres fruitiers rouges, et bananier pour les applications tardives. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 10 mètres par rapport aux points d'eau, pour l'usage sur bananier pour les applications en début de cycle.

	Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau, pour les usages sur vergers pour les applications tardives. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 25 mètres par rapport aux points d'eau, pour les usages sur vergers pour les applications en début de cycle.
SPe3 (sous abri)	Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau, pour les usages sur légumes et plantes ornementales de hauteur <50 cm pour une application dans toutes les structures sauf les applications dans les tunnels de plain-pied, les bâtiments fermés, les serres.
SPe8 (plein champ)	Pour les structures ouvertes, non permanentes et perméables, et sous tunnel: - Dangereux pour les abeilles. / Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. / Ne pas utiliser en présence d'abeilles. / Ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes. Pour protéger les arthropodes non cible, respecter une zone tampon de 5 mètres lors des utilisations avec des applications précoces sur verger.
SPe8 (sous abri)	- Pour les utilisations sur structure non permanentes ou ouvertes: - Dangereux pour les abeilles. / Pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et les périodes de production d'exsudats. / Ne pas utiliser en présence d'abeilles. / Ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes. - Pour les utilisations sur structures permanentes: «Peut affecter les insectes auxiliaires. Des précautions doivent être prises lors de l'introduction des pollinisateurs. »

MELANGES :

Les mélanges doivent être utilisés conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques agricoles. Les mélanges sont déconseillés avec des adjuvant extemporanés. Les mélanges extemporanés de produits phytosanitaires avec le OROCIDÉ sont possibles, cependant un test à petite échelle est recommandé avant les applications sur la parcelle à traiter.

CONDITIONS D'UTILISATION DU PRODUIT :

- Délai de ré-entrée : 24 heures sous abri.
- Agiter avant utilisation.
- Ajouter un agent antimousse, à 0.001% (p/v).
- Stocker le produit dans son emballage d'origine scellé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri du gel. Les bidons entamés devront être rebouchés soigneusement et utilisés dans les 6 mois.
- Éliminer les fonds de cuve par épandage rapide sur la culture la plus proche.
- Emballage : réemploi interdit.
- Rincer le bidon plusieurs fois et mélanger les eaux de rinçage à la bouillie. Éliminer les emballages vides conformément à la réglementation en vigueur.

MODE D'ACTION :

OROCIDÉ est un produit de contact avec un mode d'action physique. Sa formulation à faible tension superficielle permet à l'huile essentielle d'orange de se répandre efficacement et de couvrir complètement les ravageurs cibles, endommageant l'exosquelette des insectes à corps mou et des acariens, entraînant une mort rapide par dessiccation (séchage).

OROCIDÉ est également un fongicide de contact qui mouille et décompose les organes mycéliens externes, les sporanges et les spores, les exposant à l'effet desséchant de l'atmosphère. La dessiccation des mycéliums fongiques et du tissu foliaire infecté environnant empêche la propagation de l'infection.

TABLEAU DES USAGES ET CONSEILS D'UTILISATION :

TRAITEMENT DES PARTIES AÉRIENNES							
CULTURES	CIBLES	DOSE MAX. D'APPLICATION / HA (Concentration maximale recom- mandée)	VOLUME D'EAU L/HA (Min. – Max.)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS (intervalle minimum entre les applica- tions)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS PAR AN PAR CUL- TURE	STADE D'AP- PLICA- TION BBCH (Mini- mum – Maxi- mum)	USAGE EGA- LE- MENT AUTO- RISE SOUS ABRI
AGRUMES	Acariens et phytoptes	6 L/ha (0.6% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 70-89	NON
AGRUMES	Cicadelles, cercopides et psylles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40-89	NON
AGRUMES	Cochenilles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 70-89	NON
AGRUMES	Psylles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40-89	NON
AGRUMES	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 70-89	NON
AGRUMES	Aleurodes	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
ANANAS	Cochenilles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
ARBRES ET ARBUSTES	Cicadelles et cercopides	8 L/ha (0.8% v/v)	200 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	NON
ARBRES ET ARBUSTES	Thrips	6.4 L/ha (0.8% v/v)	200 - 800	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	NON
ARBRES ET ARBUSTES	Oïdium	6 L/ha (0.6% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
AVOCATIER	Aleurodes	0.8 L/ha (0.8% v/v)	100	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
AVOCATIER	Cochenilles	0.8 L/ha (0.8% v/v)	100	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
AVOCATIER	Thrips	0.8 L/ha (0.8% v/v)	50 - 100	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
AVOCATIER	Tigres	1 L/ha (1% v/v)	50 - 100	6 (7 jours)	6	BBCH 70 - 89	NON
BANANIER	Aleurodes	2 L/ha (0.8% v/v)	100 - 250	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
BANANIER	Cochenilles	2 L/ha (0.8% v/v)	100 - 250	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
BANANIER	Thrips	2 L/ha (0.8% v/v)	200 - 250	6 (7 jours)	6	BBCH 70 - 89	NON
CAROTTE	Oïdium	2.4 L/ha (0.6% v/v)	100 - 400	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
CASSISSIER	Acariens et phytoptes	2 L/ha (1% v/v)	200	2 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
CASSISSIER	Cicadelles, cercopides et psylles	2.4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 300	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
CASSISSIER	Oïdium	2.4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 300	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
CHICOREES – Production de ra- cines	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	NON
CHOUX	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
CHOUX	Thrips	4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
CHOUX FEUIL- LUS	Rouilles	2 L/ha (0.5% v/v)	100 - 400	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI

TRAITEMENT DES PARTIES AÉRIENNES							
CULTURES	CIBLES	DOSE MAX. D'APPLICATION / HA (Concentration maximale recom- mandée)	VOLUME D'EAU L/HA (Min. – Max.)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS (intervalle minimum entre les applica- tions)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS PAR AN PAR CUL- TURE	STADE D'AP- PLICA- TION BBCH (Mini- mum – Maxi- mum)	USAGE ÉGA- LE- MENT AUTO- RISE SOUS ABRI
CONCOMBRE	Aleurodes	4 L/ha (0.4% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
CONCOMBRE	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12-49	OUI
CONCOMBRE	Oïdium	8 L/ha (0.8% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
CORNICHON	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
CORNICHON	Oïdium	4 L/ha (0.8% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
COURGETTE	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	3 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
COURGETTE	Oïdium	4 L/ha (0.8% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	OUI
CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES	Aleurodes	4 L/ha (0.4% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES	Thrips	6.4 L/ha (0.8% v/v)	200 - 800	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	OUI
CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES	Oïdium	6 L/ha (0.6% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
CULTURES FLORALES ET PLANTES VERTES	Rouille	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	3 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
FINES HERBES (Estragon)	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
FINES HERBES (Persil)	Oïdium	1.8 L/ha (0.6% v/v)	100 - 300	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
FRAISIER	Thrips	4 L/ha (0.8% v/v)	200 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
FRAISIER	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	200 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
FRAMBOISIER	Acariens et phytoptes	2 L/ha (1% v/v)	200	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
FRAMBOISIER	Cicadelles, cercopides et psylles	2.4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 300	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
FRAMBOISIER	Oïdium	2.4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 300	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
FRUIT DE LA PASSION	Acariens	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 70	NON
FRUIT DE LA PASSION	Cochenilles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	NON
FRUIT DE LA PASSION	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	NON
GOYAVIER	Aleurodes	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
HOUBLON	Oïdium	6 L/ha (0.6% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
INFUSIONS (sé- chées)	Maladies fongiques	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
KIWI	Cicadelles, cercopides et psylles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 75 - 81	NON

TRAITEMENT DES PARTIES AÉRIENNES							
CULTURES	CIBLES	DOSE MAX. D'APPLICATION / HA (Concentration maximale recom- mandée)	VOLUME D'EAU L/HA (Min. – Max.)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS (intervalle minimum entre les applica- tions)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS PAR AN PAR CUL- TURE	STADE D'AP- PLICA- TION BBCH (Mini- mum – Maxi- mum)	USAGE ÉGA- LE- MENT AUTO- RISE SOUS ABRI
LAITUE	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
LAITUE	Mildiou	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
LAITUE	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
LEGUMI- NEUSES POTA- GERES (SE- CHES)	Thrips	4 L/ha (0.8% v/v)	200 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
MANGUIER	Aleurodes	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
MANGUIER	Cochenilles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 70 - 89	NON
MANGUIER	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
MANGUIER	Oïdium	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
MELON	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12-89	OUI
MELON	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	OUI
MELON	Oïdium	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	OUI
NAVET	Mildiou	3.2 L/ha (0.4% v/v)	300 - 800	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	OUI
ONION	Thrips	3.2 L/ha (0.8% v/v)	200 - 400	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	OUI
PALMIERS ALI- MENTAIRES	Aleurodes	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
PAPAYER	Acariens	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 70	NON
PAPAYER	Cochenilles	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 70 - 89	NON
PAPAYER	Oïdium	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
PÊCHER	Oïdium	6 L/ha (0.6% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 50 - 89	NON
POIREAU	Thrips	6.4 L/ha (0.8% v/v)	500 - 800	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	OUI
POIVRON	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
POMMIER	Cicadelles, cercopides et psylles	4 L/ha (0.8% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
POMMIER	Psylles	2.8 L/ha (0.4% v/v)	300 - 700	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	NON
POMMIER	Oïdium	2.8 L/ha (0.4% v/v)	300 - 700	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	NON
ROSIER	Aleurodes	4 L/ha (0.4% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
ROSIER	Thrips	8 L/ha (0.8% v/v)	500 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
ROSIER	Oïdium	6 L/ha (0.6% v/v)	300 - 1000	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	OUI
SALSIFIS	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	300 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 69	NON

TRAITEMENT DES PARTIES AERIENNES							
CULTURES	CIBLES	DOSE MAX. D'APPLICATION / HA (Concentration maximale recom- mandée)	VOLUME D'EAU L/HA (Min. – Max.)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CATIONS (intervalle minimum entre les applica- tions)	NOMBRE MAX. D'APPLI- CA- TIONS PAR AN PAR CUL- TURE	STADE D'AP- PLICA- TION BBCH (Mini- mum – Maxi- mum)	USAGE EGA- LE- MENT AUTO- RISE SOUS ABRI
TABAC	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	NON
TABAC	Thrips	3.2 L/ha (0.8% v/v)	100 - 400	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 49	NON
TABAC	Mildiou	3 L/ha (0.6% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
TABAC	Oïdium	3 L/ha (0.6% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
TOMATE	Aleurodes	2 L/ha (0.4% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
TOMATE	Thrips	4 L/ha (0.8% v/v)	100 - 500	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	OUI
VIGNE	Erinose	2 L/ha (1% v/v)	200	2 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
VIGNE	Cicadelles	1.6 L/ha (0.8% v/v)	100 - 200	6 (7 jours)	6	BBCH 40 - 89	NON
VIGNE	Thrips	1.6 L/ha (0.8% v/v)	100 - 200	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 89	NON
VIGNE	Mildiou	1.6 L/ha (0.8% v/v)	100 - 200	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
VIGNE	Oïdium	1.6 L/ha (0.8% v/v)	100 - 200	6 (7 jours)	6	BBCH 12 - 77	NON
PERIODE DE RE-ENTREE : 24 heures (Travailleur - sous abri) / DELAIS AVANT RECOLTE : 1 jour							

La dose d'application de l'OROCIDÉ doit être déterminée sur la base de la dose par hectolitre (% v/v) et du volume d'eau adapté au développement végétatif de la culture sans dépasser la dose maximale d'application par hectare.

Pour assurer une efficacité optimale contre le ravageur ou la maladie ciblé, la solution de pulvérisation doit couvrir de façon suffisante la culture.

L'application doit être effectuée lorsque les premiers symptômes de la maladie apparaissent, ou suite à l'observation de l'organisme nuisible cible sur la culture.

Compte tenu de la diversité des espèces et des variétés, il est recommandé avant d'utiliser la préparation OROCIDÉ sur de grandes surfaces de tester la sélectivité de la préparation sur quelques plantes de la même variété et au même stade de développement.

Ne pas dépasser la dose maximale d'application. Ne pas pulvériser au-delà du point de ruissellement.

Pour limiter le risque de phytotoxicité, le volume d'eau et l'équipement de pulvérisation doivent être adaptés au stade de développement de la culture et l'application doit être effectuée à des températures modérées, en évitant les heures les plus chaudes de la journée.

TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE DE CETTE ÉTIQUETTE EST INTERDITE. RESPECTER LES USAGES, DOSES, CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MENTIONNÉES SUR L'EMBALLAGE. ILS ONT ÉTÉ DÉTERMINÉS EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET DES APPLICATIONS POUR LESQUELLES IL EST PRÉCONISÉ. CONDUIRE SUR CES BASES, LA CULTURE ET LES TRAITEMENTS SELON LA BONNE PRATIQUE AGRICOLE

EN TENANT COMPTE, SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR, DE TOUS LES FACTEURS PARTICULIERS CONCERNANT VOTRE EXPLOITATION TELS QUE LA NATURE DU SOL, LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, LES MÉTHODES CULTURALES, LES VARIÉTÉS VÉGÉTALES, LA RÉSISTANCE D'ESPECES... LE FABRICANT GARANTIT LA QUALITE DU PRODUIT VENDU DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE ET STOCKE SELON LES CONDITIONS PRECONISEES, AINSI QUE SA CONFORMITE A L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DELIVREE PAR LES AUTORITES COMPETENTES FRANCAISE. POUR LES DENREES ISSUES DE CULTURES PROTÉGÉES AVEC CETTE SPÉCIALITÉ ET POUR L'EXPORTATION, IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EXPORTATEUR DE S'ASSURER DE LA CONFORMITE AVEC LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS IMPORTATEUR.